

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Урофосфабол®

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 2.0 г

ООО «ПФК «Пребенд», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «25» 07 19 г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Урофосфабол® Международное непатентованное название: фосфомицин Химическое название: Динатрия (2R, 3S) – (3-метилоксиран-2-ил) фосфонат. Состав на один флакон: фосфомицин натрия состоит из: <i>активное вещество:</i> фосфомицин динатрия (в пересчете на фосфомицин) 2,0 г <i>вспомогательное вещество:</i> Янтарная кислота 0,04 г Описание: порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета.	Торговое наименование: Урофосфабол® Международное непатентованное наименование: фосфомицин. Раздел удален Состав: состав на 1 флакон: <i>действующее вещество:</i> фосфомицина динатриевая соль 2,74 г (в пересчете на фосфомицин) 2,0 г <i>вспомогательное вещество:</i> янтарная кислота 0,04 г Описание: порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Восстановленный раствор: прозрачная бесцветная жидкость или с желтоватым, или коричневатно-желтоватым оттенком.

Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 2,0 г. По 2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные, вместимостью 20 мл, герметично укупоренные пробками из резины, обжатые колпачками алюминиевыми или обжатые колпачками комбинированными (алюминиевыми с предохранительными пластмассовыми крышками). 1 флакон с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Срок годности 2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Условия отпуска из аптек По рецепту врача.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 2,0 г. По 2,0 г действующего вещества во флаконы стеклянные по 20 мл, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатые колпачками алюминиевыми или комбинированными (алюминиевыми с предохранительными пластмассовыми крышками). 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению помещают в пачку из картона. Срок годности 4 года. Не применять после истечения срока годности. Условия отпуска Отпускают по рецепту.
--	---

Начальник отдела регистрации
лекарственных средств
ООО «ПФК «Пребед»



С.Ю. Клепикова