МИНЗДРАВ РОССИИ
П N015232/01-220421
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

5-Фторурацил-Эбеве

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл

Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ, Австрия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «____» 220421 _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Доза и схема терапии определяются индивидуально в зависимости от состояния пациента и вида рака, а также в зависимости от того, применяется ли фторурацил в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами. Начинать лечение необходимо в условиях стационара. Препарат вводят внутривенно струйно или путем медленной инфузии, внутриартериально, внутриполостно.	**Способ применения и дозы** Доза и схема терапии определяются индивидуально в зависимости от состояния пациента и вида рака, а также в зависимости от того, применяется ли фторурацил в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами. Начинать лечение необходимо в условиях стационара. Препарат вводят внутривенно струйно или путем медленной инфузии, внутриартериально, внутриполостно.

Суточная доза фторурацила не должна превышать 1 г. Рекомендуются следующие дозы и режимы: - 500 мг/м^2 или 12-13,5 мг/кг ежедневно в течение 3-5 дней, интервал между курсами - 4 недели; - 600 мг/м^2 или 15 мг/кг (высшая разовая доза 1 г) 1 раз в неделю, 6-10 доз; - 600 мг/м^2 в 1 и 8 дни внутривенно в комбинациях с другими цитостатиками; - 1 г/м^2/сутки внутривенно капельно в виде постоянной инфузии в течении 96-120 часов. При применении в сочетании с кальция фолинатом дозу фторурацила обычно уменьшают на 25 - 30 %. Фторурацил следует разводить только физиологическим раствором или 5 % раствором глюкозы. Фторурацил нельзя разводить растворами с pH < 8, так как в этой среде фторурацил образует осадок.	Суточная доза фторурацила не должна превышать 1 г. Рекомендуются следующие дозы и режимы: - 500 мг/м^2 или 12-13,5 мг/кг ежедневно в течение 3-5 дней, интервал между курсами - 4 недели; - 600 мг/м^2 или 15 мг/кг (высшая разовая доза 1 г) 1 раз в неделю, 6-10 доз; - 600 мг/м^2 в 1 и 8 дни внутривенно в комбинациях с другими цитостатиками. При применении в сочетании с кальция фолинатом дозу фторурацила обычно уменьшают на 25 - 30 %. Фторурацил следует разводить только физиологическим раствором или 5 % раствором глюкозы. Фторурацил нельзя разводить растворами с pH < 8, так как в этой среде фторурацил образует осадок.

Специалист по регистрации
ЗАО «Сандоз» Латохина Е.А.