



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фторурацил-РОНЦ®

раствор для внутрисосудистого и внутримышечного введения 50 мг/мл

ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 31 07 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутрисосудистого и внутримышечного введения 50 мг/мл. По 5 мл, 10 мл, 20 мл или 100 мл во флаконах светозащищенного стекла I гидролитического класса вместимостью 5 мл или 10 мл или 20 мл или 100 мл соответственно, укупоренных пробками из бромбутилового каучука под обкатку алюминиевыми колпачками или алюминиевыми колпачками с пластмассовой вставкой. По одному флакону в картонной пачке с инструкцией по применению.	Форма выпуска Раствор для внутрисосудистого и внутримышечного введения 50 мг/мл. По 5 мл, 10 мл, 20 мл или 100 мл во флаконах светозащищенного стекла I гидролитического класса вместимостью 6 мл или 10 мл или 20 мл или 100 мл соответственно, укупоренных пробками из бромбутилового каучука под обкатку алюминиевыми колпачками или алюминиевыми колпачками с пластмассовой вставкой. По одному флакону в картонной пачке с инструкцией по применению.
Срок годности 2 года. Не применять по истечении срока годности.	Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Директор филиала «Научпрофи»
ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России



С.В. Копачевская

127028