

ИНСТРУКЦИЯ
 ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
 ПРЕПАРАТА

Фторурацил-РОНЦ®

раствор для внутрисосудистого и внутриместного введения 50 мг/мл

ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 200921 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Фторурацил-РОНЦ® входит в состав многих схем химиотерапевтического лечения, в связи с чем, при выборе пути введения, режима и доз в каждом индивидуальном случае следует руководствоваться данными специальной литературы. Препарат вводят внутривенно струйно или путем медленной инфузии, внутриартериально, внутриместно. Рекомендуются следующие дозы и режимы: - 500 мг/м² или 12-13,5 мг/кг ежедневно в течение 3-5 дней, интервал между курсами - 4 недели; - 600 мг/м² или 15 мг/кг (высшая разовая доза 1 г) 1 раз в неделю, 6-10 доз; - 600 мг/м² в 1 и 8 дни внутривенно в комбинациях с другими цитостатиками; - 1 г/м²/сутки внутривенно капельно в виде постоянной инфузии в течение 96-120 часов.	Способ применения и дозы Фторурацил-РОНЦ® входит в состав многих схем химиотерапевтического лечения, в связи с чем, при выборе пути введения, режима и доз в каждом индивидуальном случае следует руководствоваться данными специальной литературы. Начинать лечение необходимо в условиях стационара. Суточная доза не должна превышать 1 г. Препарат вводят внутривенно струйно или путем медленной инфузии, внутриартериально, внутриместно. Рекомендуются следующие дозы и режимы: - 500 мг/м² или 12-13,5 мг/кг ежедневно в течение 3-5 дней, интервал между курсами - 4 недели; - 600 мг/м² или 15 мг/кг (высшая разовая доза 1 г) 1 раз в неделю, 6-10 доз; - 600 мг/м² в 1 и 8 дни внутривенно в

Старая редакция	Новая редакция
При применении в сочетании с кальция фолинатом дозу фторурацила обычно уменьшают на 25-30 %.	комбинациях с другими цитостатиками. При применении в сочетании с кальция фолинатом дозу фторурацила обычно уменьшают на 25-30 %. Фторурацил следует разводить только 0,9 % раствором натрия хлорида или 5 % раствором декстрозы. Фторурацил нельзя разводить растворами с $\text{pH} < 8$, так как в этой среде фторурацил образует осадок.

Директор филиала «Наукопрофи»
ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Блохина» Минздрава России



А.В. Белов