ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АМИДЕНТ®

Регистрационный номер
Торговое название препарата: Амидент®
Международное непатентованное название: хлоргексидин
Лекарственная форма: раствор для местного применения.
Состав: активное вещество: хлоргексидина биглюконат концентрат для приготовления раствора для наружного и местного применения (в пересчете на 100% вещество) - 0,15 г; глицерол (глицерин дистиллированный), масло мяты перечной, метиленовый синий, вода очищенная – до 100 мл.
Описание: прозрачный или слегка опалесцирующий раствор светло-голубого цвета с ароматом мяты.
Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.
Код АТХ [A01AB03].
Фармакологические свойства
Хлоргексидин активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, обладает выраженными антисептическими свойствами, разрушает бактериальный налет, способствует снижению воспаления слизистой оболочки полости рта и краевой десны.
Фармакокинетика
Практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта. После случайного проглатывания 300 мг максимальная концентрация в плазме достигается через 30 мин и составляет 0.206 мкг/л. Выводится в основном с каловыми массами (90%), менее 1% выделяется почками.
Показания к применению
Гингивит, парадонтит, стоматит, повреждения слизистой оболочки полости рта и десны в результате хирургических вмешательств (операции на деснах, удаление зубов, дентальная имплантация), высыпания невирусной этиологии, эрозии, пролежни слизистых оболочек полости рта, ожоги слизистой оболочки и краевой десны (термические и химические, при диатермокоагуляции и лазерной хирургии), повреждения слизистой и краевой десны при препарировании зубов и ретракции перед снятием слепков, потертости при ношении съемных протезов, ортопедических и ортодонтических конструкций. Раствор Амидент рекомендуется применять при гигиенических мероприятиях в полости рта, перед различными вмешательствами (хирургические манипуляции, снятие околозубных отложений, перед инъекциями в десну лекарственных средств), для удаления бактериального налета в полости рта.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата
С осторожностью
Детский возраст, беременность, период лактации.
Применение при беременности и в период лактации
Безопасность применения при беременности и в период лактации не установлена. Возможно использование препарата при крайней необходимости, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.
Способ применения и дозы
Применяется местно. При гингивите, парадонтите, стоматите, повреждениях десен и слизистой оболочки в виде ротовых ванночек в течение 1-2 минут, 5-6 раз в сутки не менее 7 дней. Раствор следует при этом разводить в соотношении 1:1 водой. Для этого Амидент® налить в мерный стаканчик 2,5 мл раствора и добавить равное количество кипяченой воды комнатной температуры. При гигиенических мероприятиях и перед различными вмешательствами в течение 30-60 секунд интенсивно полоскать полость рта. Амидент® следует развести в соотношении 1:2. Для этого

следует отмерить прилагаемой ложечкой 2,5 мл раствора в стаканчик и добавить 5 мл кипяченой воды комнатной температуры.

Побочное действие
Аллергические реакции.
Окрашивание эмали зубов, отложение зубного камня, изменение вкуса.

Передозировка
При случайном попадании внутрь препарат практически не абсорбируется.
Лечение: следует сделать промывание желудка, используя молоко, сырое яйцо, желатин.
При необходимости проводится симптоматическая терапия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Фармацевтически несовместим с мылом, щелочами и другими анионными соединениями (коллоиды, гуммиарабик, карбоксиметилцеллюлоза).
Совместим с лекарственными средствами, содержащими катионную группу (бензалкония хлорид, цетримония бромид).
Повышает чувствительность бактерий к хлорамфениколу, неомицину, цефалоспоринам.
Этанол усиливает эффективность препарата.
Особые указания
В случае попадания на слизистые оболочки глаз их следует быстро и тщательно промыть большим количеством воды. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.
Применение жесткой воды снижает бактерицидные свойства Амидента.
Форма выпуска
Раствор для местного применения 0,15 %. По 100 и 150 мл во флаконах светозащитного стекла. Каждый флакон вместе с мерной ложечкой и инструкцией по применению в пачке из картона.
Условия хранения
В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Наименование и адрес изготовителя/организация, принимающая претензии:
ОАО "Фармстандарт - Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-ая Агрегатная, д.1а/18
Тел./факс: (4712) 34-03-13

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Представитель
ОАО «Фармстандарт - Лексредства» С.В. Барыкин