


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Хлоргексидин-Ферейн®



раствор для наружного применения спиртовой, 0,5 %

ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А», Россия

Изменение № 3


100818

Дата внесения Изменения « ____ » ____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Хлоргексидин-Ферейн® Торговое название: Хлоргексидин-Ферейн® Побочное действие Аллергические реакции (кожная сыпь), сухость кожи, зуд, дерматит, липкость кожи рук (в течение 3-5 мин), фотосенсибилизация. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ БиоАсептик Торговое наименование: БиоАсептик Побочное действие: Аллергические реакции (кожная сыпь), сухость кожи, зуд, дерматит, липкость кожи рук (в течение 3-5 мин), фотосенсибилизация, тяжелые аллергические реакции, включая анафилаксию. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Генеральный директор

ПАО «БРЫНЦАЛОВ-А»



ИЗЭСМП



Московская З. И.

111737