

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
117-002978-241221

СОГЛАСОВАНО

БиоАсептик

(наименование лекарственного препарата)

Хлоргексидин

(международное непатентованное, группировочное или химическое
наименование)

раствор для наружного применения спиртовой, 0,5 %

(лекарственная форма, дозировка)

ПАО «Брынцалов-А», Россия

Изменение № 7

Дата внесения Изменения « » 24 12 21 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Форма выпуска. Раствор для наружного применения спиртовой, 0,5 %. По 100 мл во флаконы из светозащитного стекла или в стеклянные бутылки, укупоренные колпачками алюминиевыми или в бутылки из полиэтилентерефталата или из полиэтилена низкого	Форма выпуска. Раствор для наружного применения спиртовой, 0,5 %. По 100 мл во флаконы из светозащитного стекла или в стеклянные бутылки, укупоренные колпачками алюминиевыми или крышками навинчиваемыми, или в бутылки из полиэтилентерефталата,

Старая редакция	Новая редакция
1	2
давления, укупоренные колпачками полиэтиленовыми винтовыми или колпачками полипропиленовыми винтовыми или колпачками алюминиевыми. Каждый флакон, бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. При нанесении текста инструкции по применению на пачку, инструкцию в пачку не вкладывают. <u>Для стационаров</u> По 40 флаконов, бутылок по 100 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона. По 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л в бутылки из полиэтилентерефталата или из полиэтилена низкого давления, укупоренные колпачками полиэтиленовыми винтовыми или полипропиленовыми винтовыми. По 20, 40 бутылок по 200 мл, по 20 бутылок по 250 мл, по 1, 6, 9, 12 бутылок по 500 мл, по 1, 6, 9	или из полиэтилена низкого давления, укупоренные колпачками полиэтиленовыми винтовыми или колпачками полипропиленовыми винтовыми или колпачками алюминиевыми. Каждый флакон, бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. При нанесении текста инструкции по применению на пачку, инструкцию в пачку не вкладывают. <u>Для стационаров</u> По 40 флаконов, бутылок по 100 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона. По 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л в бутылки из полиэтилентерефталата или из полиэтилена низкого давления, укупоренные колпачками полиэтиленовыми винтовыми или полипропиленовыми винтовыми. По 20, 40 бутылок по 200 мл, по 20 бутылок по 250 мл, по 1, 6, 9, 12

Старая редакция	Новая редакция
1	2
бутылок по 1 л вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона. По 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21,5 л в канистры из полиэтилена низкого давления. На канистру, бутылку дополнительно наклеивают контрэтикетку с текстом инструкции по применению или прикладывают инструкцию по применению.	бутылок по 500 мл, по 1, 6, 9 бутылок по 1 л вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона. По 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21,5 л в канистры из полиэтилена низкого давления. На канистру, бутылку дополнительно наклеивают контрэтикетку с текстом инструкции по применению или прикладывают инструкцию по применению.

Начальник отдела регистрации
лекарственных препаратов
ПАО «Брынцалов-А»



Е.И. Осипова