ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
ГЕКСИКОН®

Регистрационный номер

Торговое название препарата Гексикон®

Международное непатентованное название хлоргексидин

Химическое название N,N –бис (4 -хлорфенил)-3,12 -диимино –2,4,11,13 – тетраазатетрадекандиимидамид (в виде ди –D-глюконата)

Лекарственная форма раствор для наружного применения

Описание

Бесцветная прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха.

Состав

Активное вещество: хлоргексидина биглюконат 20 % - 0,25 мл, вспомогательное вещество: вода очищенная - до 100 мл.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство

Код АТХ: D08AC02

Фармакологические свойства

Гексикон® - антисептический препарат, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis); простейших (Trichomonas vaginalis); вирусов (Herpes-virus). Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика: Практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания 300 мг максимальная концентрация достигается через 30 мин и составляет 0,206 мкг/л. Выводится в основном с каловыми массами (90%), менее 1% выделяется почками.

Показания к применению

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и др.).

КОПИЯ ВЕРНА
По доверенности
ОАО «НИЖФАРМ»
Валькова О.Ю.
23.07.2009

Дезинфекция гнойных ран, инфицированных ожоговых поверхностей; лечение инфекций кожи и слизистых оболочек в хирургии, акушерстве-гинекологии, урологии (уретриты, уретропростатиты), стоматологии (полоскания и орошения – гингивит, стоматит, афты, парадонтит, альвеолит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дерматиты, аллергические реакции.

С осторожностью

Детский возраст.

Способ применения и дозы

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем, Гексикон® эффективен, если он применен не позже 2 часов после полового акта.
Содержимое флакона с помощью насадки ввести в мочеиспускательный канал мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл) и задержать на 2-3 минуты.
Обработать раствором кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов. После процедуры не следует мочиться в течение двух часов.

Комплексное лечение уретритов и уретропростатитов проводят путем впрыскивания в уретру 2-3 мл раствора Гексикон® 1-2 раза в день, курс – 10 дней. Процедуры назначают через день.

Раствор Гексикон® применяется также в виде орошений, полосканий и аппликаций – 5-10 мл раствора наносят на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек с экспозицией 1-3 мин 2-3 раза в сутки (на тампоне или путем орошения).

Побочное действие

Аллергические реакции, зуд, сухость кожи, зуд, дерматит, липкость кожи рук (в течение 3-5 мин), фотосенсибилизация. При лечении гингивитов - окрашивание эмали зубов, отложение зубного камня, нарушение вкуса.

Взаимодействие с другими препаратами
Не рекомендуется одновременное применение с йодом.
Гексикон® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.
Этанол усиливает эффективность препарата.

Особые указания
Следует избегать попадания препарата внутрь раны у пациентов с открытой черепномозговой травмой, повреждениями спинного мозга, перфорацией барабанной перепонки.

В случае попадания раствора на слизистые оболочки глаза их следует быстро и тщательно промыть водой.

Попадание гипохлоритных отбеливающих веществ на ткани, которые ранее находились в контакте с содержащими хлоргексидин препаратами, может способствовать появлению на них коричневых пятен.

Бактерицидное действие усиливается с повышением температуры. При температуре выше 100°С препарат частично разлагается.

Форма выпуска

Гексикон® раствор для наружного применения 0,05 % по 10 мл, 50 мл, 70 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл и 500 мл во флаконах из полиэтилена с полимерной насадкой; флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке.

КОПИЯ ВЕРНА
По доверенности
ОАО «Нижфарм»
Валькова О.Ю.
23.07.2009

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25^0С.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Изготовитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

факс (8312) 30-72-28

тел (8312) 78-80-88

Директор ИДКЭЛС, профессор В.В.Чельцов

Генеральный директор ОАО "Нижфарм" А.Л.Младенцев

КОПИЯ ВЕРНА
По доверенности
ОАО «НИЖФАРМ»
Валькова О.Ю.
23.07.2009