

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Гексосепт-Рн****Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Гексосепт-Рн**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Хлоргексидин.**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные.**Состав****Один суппозиторий содержит:***действующее вещество:* хлоргексидина биглюконат – 16,0 мг (что соответствует 85,20 мг 20 % раствора хлоргексидина биглюконата);*вспомогательное вещество:* макрогол 1000 (полиэтиленоксид 1000) – до 3100 мг.**Описание**

Суппозитории торпедовидной формы, белого или желтовато-белого цвета. Допускается наличие воронкообразного углубления. На продольном срезе допускается наличие воздушного стержня.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство**Код АТХ:** G01AX**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Гексосепт-Рн – антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов в т.ч.: *Treponema pallidum*, *Chlamydia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes-virus*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы. Хлоргексидин не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько

пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания к применению

Лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в том числе неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и др.).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлоргексидину и другим компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания. Перед применением препарата Гексосепт-Рн, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. Перед применением препарата Гексосепт-Рн в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Интравагинально.

Перед применением суппозиторий следует извлечь из контурной упаковки и ввести глубоко во влагалище.

Для лечения: по 1 вагинальному суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7-10 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем: 1 вагинальный суппозиторий не позднее 2 часов после незащищенного полового акта.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат

только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (сыпь, зуд), жжение. Хлоргексидин в очень редких случаях ($<0,0001\%$) может вызывать реакции повышенной чувствительности, включая тяжелые аллергические реакции и анафилаксию.

В отдельных случаях возможно появление сукровичных выделений из влагалища (см. раздел «Особые указания»).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Гексосепт-Рн несовместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Особые указания

Препарат предназначен для интравагинального применения только у взрослых пациентов.

При появлении аллергических реакций или раздражения в месте введения препарата лечение прекращают.

При применении препарата возможно увеличение количества выделений из влагалища. Как правило, при небольшом количестве прозрачных выделений лечение препаратом можно не прерывать. При появлении сукровичных выделений пациентке рекомендуется прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

После контакта с препаратом следует вымыть руки, во избежание возможного попадания хлоргексидина в глаза.

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев, так как препарат применяется интравагинально.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами, требующими повышенного внимания и повышенной реакции психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные 16 мг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из полимерной пленки ПВХ/ПЭ. По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б, тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс: +375 (212) 36-37-06, e-mail: secretar@rubikon.by, www.rubikon.by

Организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «Рубикон», РБ, 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б, тел: +375 (212) 36-47-77, тел/факс: +375 (212) 36-37-06, +375 (292) 10-22-74, e-mail: secretar@rubikon.by, www.rubikon.by

Генеральный директор
ООО «РегМед проф.»



Стенина И.А.