МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Хлоргексидин

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007353-010921
СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Хлоргексидин

Международное непатентованное или группировочное наименование: хлоргексидин

Лекарственная форма: раствор для полоскания

Состав:

Действующее вещество:

Хлоргексидина биглюконат полуфабрикат-раствор 20 % - 2,5 мл (эквивалентно 0,5 г хлоргексидина биглюконата)

Вспомогательные вещества:

Вода очищенная - до 1000 мл

Описание: бесцветная прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость без запаха или со слабым запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ D08AC02

Фармакологическое действие

Антисептическое средство, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий; простейших; вирусов. Сохраняет активность (хотя несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика: При местном применении практически не всасывается.

128433

Показания к применению

Лечение слизистых оболочек в стоматологии (полоскание и орошение) - гингивит, стоматит, афты, парадонтит, альвеолит.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007353-010921
СОГЛАСОВАНО

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлоргексидину, дерматит

С осторожностью

Детский возраст, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если предполагаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Полоскание. Готовым раствором проводят полоскание полости рта 2-3 раза в сутки. Длительность лечения определяется врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции, окрашивание эмали зубов, отложение зубного камня, нарушение вкуса, тяжелые аллергические реакции, включая

128433

анафилаксию. Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ЛП - 007353-010921
СОГЛАСОВАНО

Передозировка

Лечение: при случайном попадании внутрь практически не абсорбируется (следует сделать промывание желудка и для связывания препарата в ЖКТ рекомендуется использовать молоко, сырое яйцо, желатин). При необходимости проводится симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Хлоргексидин не совместим с карбонатами, хлоридами, фосфатами, боратами, сульфатами и цитратами. Перед применением проконсультируйтесь с врачом

Особые указания

При случайном попадании раствора хлоргексидина на слизистую оболочку глаз, следует быстро и тщательно промыть глаза водой. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Раствор для полоскания, 0,05 %.

128433

По 50, 100, 150, 200, 250 мл во флаконы полиэтиленовые, укупоренные полимерными пробками-капельницами и крышкой навинчиваемой полимерной или крышкой навинчиваемой полимерной.

По 50, 100, 150, 200, 250 мл во флаконы полиэтилентерефталатные, укупоренные крышками навинчиваемыми полиэтиленовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007353-010921
СОГЛАСОВАНО

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии

ООО «Лекарь»,

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. 1-я Монтажная, д. 12Б

Тел/факс: 8(846) 211-11-80

Генеральный директор
ООО «Лекарь» Бобров Д.Ю.

ООО "ЛЕКАРЬ"

МЗ РФ
ФГБУ НЦЭСМП
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

128433