ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МУНДИЗАЛ
MUNDISAL

Регистрационный номер

Торговое название: МУНДИЗАЛ

Лекарственная форма: гель для местного применения

Состав препарата: в 1 г содержится:

Активные вещества:

холина салицилат – 87,1 мг

вспомогательные вещества: цеталкония хлорид, гипромеллоза, глицерол, цикламат натрия, анисовое масло, ментол, этанол 96%, вода очищенная.

Описание: прозрачный вязкий гель с анисовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа: НПВП

Код АТХ:**A01AD11**

Фармакологические свойства

При местном применении главное действующее вещество холина салицилат быстро всасывается слизистой оболочкой полости рта, оказывая местное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Тормозит активность циклооксигеназы, функции макрофагов и нейтрофилов, продукцию интерлейкина-1 и угнетает синтез простагландинов. Обладает также противомикробным и противогрибковым действием (в кислой и щелочной среде).

Гелевая этанолсодержащая адгезивная основа обеспечивает быстрое развитие эффекта и длительно удерживает на слизистой оболочке действующие вещества.

Обезболивающее действие наступает через 2-3 минуты, при этом его продолжительность составляет 2-8 часов.

Фармакокинетика При нанесении на слизистые оболочки хорошо всасывается.

Показания к применению

Для местного применения на слизистые оболочки полости рта в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства при лечении заболеваний пародонта, повреждений

слизистой оболочки, заболеваний протекающих с воспалительной реакцией и болью, в том числе:

- стоматиты различной этиологии,
- гингивиты,
- пародонтиты,
- повреждения слизистой оболочки при ношении зубных протезов,
- травмы слизистой оболочки полости рта,
- боль при прорезывании зубов у детей,
- хейлиты,
- небольшие оперативные вмешательства,
- мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона) – в составе комплексной терапии

Противопоказания

Повышенная чувствительность к салицилатам и другим компонентам препарата.

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Местно. Мундизал гель применяют 2-3 раза в день до еды (с целью обезболивания) или после еды и перед сном. Гель в количестве 1 см для взрослых и 0,5 см для детей выдавливают на чистый палец и втирают легкими массирующими движениями в пораженный участок слизистой оболочки полости рта.

При заболеваниях пародонта гель вводится в карманы или применяется в виде компрессов, или осторожно втирается в десны 1-2 раза в день.

Побочные эффекты

Кратковременное легкое жжение в местах нанесения препарата, проходящее самостоятельно. Аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие других противовоспалительных, жаропонижающих и болеутоляющих средств.

Особые указания

При появлении первых признаков побочного действия препарата необходимо сразу сообщить об этом лечащему врачу.

Использовать препарат только для местного применения.

Не ограничивает психофизическую активность, способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

Условия хранения

Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

Форма выпуска

Гель для местного применения в тубах алюминиевых по 8 г. Каждую тубу с инструкцией по применению в пачку картонную.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

Мундифарма Г.м.б.Х., Германия

Германия, D-65549, Лимбург (Лан), Мундифарма Штрассе 2, а/я 1350, 65533 телефон +49 (6431) 7 01-0 телефакс + 49 (6431) 7 42 72

e-mail: mundipharma@mundipharma.de

Представительство в Москве:

Мундифарма Гес.м.б.Х, Австрия

125445, Москва, Смольная ул., д. 24А, офис 812.

Тел./ факс +7 (495) 642 80 81

e-mail: mundipharma@mtu-net.ru

Претензии потребителей направлять в Представительство.

Директор ИДКЭЛС,
Профессор В.В. Чельцов

Представитель Мундифарма Гес.м.б.Х
В Российской Федерации Гочелеишвили