

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
АРТРАВИР®-ТРИВИУМ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: АРТРАВИР®-ТРИВИУМ®

Группировочное наименование: хондроитина сульфат

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г мази:

Действующее вещество: хондроитина сульфат натрия – 5,0 г.

Вспомогательные вещества:

диметилсульфоксид – 10,0 г, ланолин безводный – 15,0 г, вазелин – 50,0 г, вода очищенная – до 100,0 г.

Описание: мазь светло-желтого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие средства для лечения заболеваний костно-мышечной системы

Код АТХ: M09AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® содержит натуральный компонент хондроитина сульфат (высокомолекулярный мукополисахарид), получаемый из тканей крупного рогатого скота. Хондроитина сульфат стимулирует регенерационные (восстановительные) процессы и нормализует обмен веществ в суставном хряще, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза. Хондроитина сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы ее репарации, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани; препятствует коллапсу соединительной ткани; ингибирует ферменты, вызывающие повреждение хрящевой ткани, стимулирует синтез глюкозаминогликанов, способствует регенерации (восстановлению) суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости.

Это приводит к уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.

Фармакокинетика

Лекарственный препарат хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием радиомеченого 3Н-хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14 %. Диметилсульфоксид, входящий в состав мази, способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат после нанесения мази на кожу поступает в сустав с достижением максимальной концентрации через 30 минут и последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 час после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 часов.

Показания к применению

Препарат АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® показан к применению у взрослых пациентов от 18 лет для лечения и профилактики остеохондроза позвоночника, остеоартроза.

Противопоказания

Гиперчувствительность к хондроитина сульфату или любому из вспомогательных веществ препарата. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания возможно, когда ожидаемая польза от применения препарата для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно: наносят 2 – 3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2 – 3 минут до полного впитывания. Курс лечения: 2 – 3 недели. При необходимости курс лечения повторяют после консультации врача.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки хондроитина сульфата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата АРТРАВИР®-ТРИВИУМ® на слизистые оболочки и открытые раны. Не применять препарат без консультации врача при беременности, в период грудного вскармливания, в детском возрасте.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5 %.

Первичная упаковка

По 10 г, 15 г, 20 г, 25 г, 30 г, 50 г препарата помещают в тубу алюминиевую.

По 20 г, 25 г, 30 г или 50 г препарата помещают в банку из темного стекла, укупоренную крышкой натягиваемой из полиэтилена низкой плотности с уплотняющим элементом.

Вторичная упаковка

Каждую тубу алюминиевую или банку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «Тривиум-XXI»

Россия, 107564, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское,
ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, помещ. 11/3.

Телефон: +7 (495) 788-59-06.

www.trivium21.ru

www.artravir.ru

Производитель

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2.