МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-005817/09-230714
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Хондрогард®

наименование лекарственного препарата

раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 230714 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: - остеоартроз периферических суставов; - межпозвонковый остеохондроз и остеоартроз.	**Показания** Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: - остеоартроз периферических суставов; - межпозвонковый остеохондроз и остеоартроз. Для ускорения формирования костной мозоли при переломах.
Способ применения и дозы Препарат назначают внутримышечно по 100 мг через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 200 мг, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения - 25-30 инъекций. При необходимости через 6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения.	**Способ применения и дозы** Препарат назначают внутримышечно по 100 мг через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 200 мг, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения - 25-30 инъекций. При необходимости через 6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения. Для формирования костной мозоли курс

Старая редакция	Новая редакция
	лечения составляет 3-4 недели (10-14 инъекций через день).

Начальник медицинского отдела
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»



Тихонова И.В.