

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

НАЦЕФ®

Регистрационный номер: Р № 000882/01

Изменение № 1

Срок введения Изменения с «21» 04 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. 0,5 г и 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. 0,5 г и 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл. Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл. 1. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 2. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем и инструкцию по применению упаковывают в пачку картонную. 3. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению

Старая редакция	Новая редакция
	вкладывают в пачку картонную. 4. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 5. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.


Генеральный директор
ООО «АБОЛмед»

Маша



А.Ю.М. Кабьян

2009 г.



59250