ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА

ЦЕЗОЛИН


Регистрационный номер: **П N016211/01**

Изменение № 1

Срок введения изменений с "21" 07 2008 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Один флакон содержит цефазолина 0,5 г или 1,0 г в виде цефазолина натриевой соли. **Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения во флаконах по 0,5 г или 1,0 г. Каждый флакон упакован в картонную пачку с инструкцией по применению. **Условия хранения** Список Б. В сухом месте при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступных для детей местах.	**Состав** Каждый флакон содержит цефазолин натрия (USP) в количестве, эквивалентном 0,5 г или 1 г цефазолина (USP). **Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. По 0,5 г или 1,0 г активного вещества помещают во флакон из бесцветного стекла, укупоренный резиновой пробкой, закатанный алюминиевым колпачком и закрытый пластмассовой крышкой. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. **Условия хранения** Список Б. В сухом месте при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Глава Представительства
«Люпин Лтд.»
«25» апреля 2008 г.



С. К. Кумра