

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ

Р N 000030/01-250914

СОГЛАСОВАНО

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Цефамабол®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 1000 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО «ПФК «Пребед», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » 250914 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к цефамандолу, другим цефалоспори- нам, пенициллинам, карбапенемам; период новорожденности (до 1 мес.)	Противопоказания Повышенная чувствительность к цефамандолу, другим цефалоспори- нам, пенициллинам, карбапенемам; период новорожденности (до 1 мес.). Не применяется для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений у детей в возрасте до 3 мес. (эффективность и безопасность не установлены).
Правила приготовления растворов и введения Для в/м инъекции 1 г сухого стерильного порошка препарата Цефамабол® растворяют в 3 мл стерильной воды для инъекций или 0,9 % раствора натрия хлорида.	Правила приготовления растворов и введения Для в/м инъекции 1 г сухого стерильного порошка препарата Цефамабол® растворяют в 3 мл стерильной воды для инъекций, 0,9 % раствора натрия хлорида или 0,5 %

Старая редакция	Новая редакция
Вводят глубоко внутримышечно в участки тела с выраженным мышечным слоем (верхне-наружный квадрант ягодицы или латеральная поверхность бедра).	раствора лидокаина. Вводят глубоко внутримышечно в участки тела с выраженным мышечным слоем (верхне-наружный квадрант ягодицы или латеральная поверхность бедра).
<i>Для в/в струйного введения</i> 1 г препарата Цефамабол® растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций, 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы. Вводят внутривенно медленно, в течение 3-5 мин; возможно введение через специальный узел или порт для инъекций системы для в/в инфузий, если больной получает совместимые с препаратом Цефамабол® жидкости парентерально.	Рекомендуется провести аспирационную пробу, чтобы избежать нежелательного введения раствора в кровеносный сосуд. Применение в качестве растворителя 0,5 % раствор лидокаина противопоказано лицам с повышенной чувствительностью к местным анестетикам амидного типа (для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по применению лидокаина).
<i>Для в/в капельного введения</i> 1 г препарата Цефамабол® разводят 10 мл стерильной воды для инъекций. Полученный раствор добавляют во флакон, содержащий 50-100 мл совместимой инфузионной среды. Вводят внутривенно капельно, продолжительность введения зависит от объема раствора и может составлять 10-30 минут и более.	<i>Для в/в струйного введения</i> 1 г препарата Цефамабол® растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций, 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы. Вводят внутривенно медленно, в течение 3-5 мин; возможно введение через специальный узел или порт для инъекций системы для в/в инфузий, если больной получает совместимые

Старая редакция	Новая редакция
Раствор препарата Цефамабол® совместим с 5 % раствором декстрозы, 0,9 % раствором натрия хлорида, 10 % раствором декстрозы, водным раствором, содержащим 0,2 % натрия хлорида и 5 % глюкозы; водным раствором, содержащим 0,45 % натрия хлорида и 5 % глюкозы; водным раствором, содержащим 0,9 % натрия хлорида и 5 % глюкозы, М/6 раствором натрия лактата.	с препаратом Цефамабол® жидкости парентерально. <i>Для в/в капельного введения 1 г препарата Цефамабол® растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций. Полученный раствор переносят во флакон, содержащий 50-100 мл совместимой инфузионной среды. Вводят внутривенно капельно, продолжительность введения зависит от объема раствора и может составлять 10-30 минут и более.</i> Раствор препарата Цефамабол® совместим с 5 % раствором декстрозы, 0,9 % раствором натрия хлорида, 10 % раствором декстрозы, водным раствором, содержащим 0,2 % натрия хлорида и 5 % глюкозы; водным раствором, содержащим 0,45 % натрия хлорида и 5 % глюкозы; водным раствором, содержащим 0,9 % натрия хлорида и 5 % глюкозы, М/6 раствором натрия лактата.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить препарат в недоступных для	Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей

Старая редакция	Новая редакция
детей местах. Производитель/адрес для направления претензий ООО «АБОЛмед», Россия. Юридический адрес: 630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80. Адрес производства: 630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80.	месте. Производитель/адрес для направления претензий ООО «ПФК «Пребэнд», Россия. Юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80. Адрес производства: 630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, 4, Телефон/факс: (383) 334-09-80.

Генеральный директор

ООО «ПФК «Пребэнд»



С.Н. Низамиева