МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Цефоперус®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г, 1 г, 2 г

лекарственная форма, дозировка

Открытое Акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»), Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 110912 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г, 1 г, 2 г. По 0,5 г, 1 г, 2 г цефоперазона в стеклянные флаконы вместимостью 10 мл, 20 мл, герметически укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками алюминиевыми или колпачками комбинированными алюминиевыми с пластмассовыми крышками. 1, 5, 10 флаконов с инструкцией по применению помещают в пачки из картона. 50 флаконов помещают в коробки из картона с 5 инструкциями по применению для поставки в стационары.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г, 1 г, 2 г. По 0,5 г, 1 г, 2 г цефоперазона в стеклянных флаконах вместимостью 10 мл, 20 мл, герметически укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками алюминиевыми или колпачками комбинированными алюминиевыми с пластмассовыми крышками. 1, 5, 10 флаконов с инструкцией по применению в пачке из картона. 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в коробке из картона для поставки в стационары.

Изменение № 1 к инструкции по применению С. 2

Старая редакция	Новая редакция
1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем (10 мл воды для инъекций) помещают в контурные ячейковые упаковки из плёнки поливинилхлоридной. 1 контурную ячейковую упаковку со скарификатором ампульным и инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона. 5 флаконов с препаратом помещают в контурные ячейковые упаковки из плёнки поливинилхлоридной. 1 контурную ячейковую упаковку с 5 флаконами препарата, 1 контурную ячейковую упаковку с 5 ампулами растворителя (10 мл воды для инъекций), скарификатор ампульный, инструкцию по применению препарата помещают в пачки из картона. При использовании ампул с кольцом излома или с надрезом и точкой скарификатор ампульный не вкладывают.	Растворитель: - «Вода для инъекций» в стеклянных ампулах по 5 мл; или - «Натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9 %» в стеклянных ампулах по 5 мл; 1 флакон с препаратом, 1 или 2 ампулы с растворителем в контурной ячейковой упаковке из плёнки поливинилхлоридной. 1 контурная ячейковая упаковка с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке из картона. 1 флакон с препаратом, 1 или 2 ампулы с растворителем, с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке или коробке из картона. 5 флаконов препарата в контурной ячейковой упаковке из плёнки поливинилхлоридной. 1, 2 контурные ячейковые упаковки с флаконами препарата и инструкцией по применению в пачке из картона. 1 контурная ячейковая упаковка с флаконами препарата, 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с ампулами растворителя (по 5 ампул), инструкция по применению и скарификатор ампульный в

Изменение № 1 к инструкции по применению С. 3

Старая редакция	Новая редакция
	пачке из картона. При использовании ампул с кольцом излома или с надрезом и точкой скарификатор ампульный не вкладывают.

Зам. исполнительного директора
ОАО «Синтез» В.И. Петухов