МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Цефосин®

торговое наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
0,5 г, 1 г, 2 г

лекарственная форма, дозировка

Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез", (ОАО «Синтез»), Россия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 110912 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска. Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г, 1 г, 2 г во флаконах бесцветного или тёмного стекла вместимостью 10 мл или 20 мл. 1, 5, 10 флаконов с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 50 флаконов помещают в коробку из картона с 5 инструкциями по применению для поставки в стационары. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем (10 мл раствора натрия хлорида для инъекций 0,9 %) помещают контурную ячейковую упаковку. 1 контурную ячейко-	**Форма выпуска.** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1 г, 2 г активного вещества во флаконах бесцветного или темного стекла вместимостью 10 мл или 20 мл. 1, 5 или 10 флаконов с инструкцией по применению в пачке из картона. 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в коробке из картона (для стационаров). Растворитель "Вода для инъекций" в стеклянных ампулах по 5 мл. 1 флакон с препаратом по 0,5 г, 1 г, 1 ампула с растворителем в контурной ячейко-

Старая редакция	Новая редакция
вую упаковку со скарификатором ампульным и инструкцией по применению препарата помещают в пачку из картона. 5 флаконов с препаратом помещают в контурную ячейковую упаковку с 5 ампулами растворителя (10 мл раствора натрия хлорида для инъекций 0,9 %), скарификатор ампульный инструкцию по применению препарата помещают в пачку из картона. При использовании ампул с кольцом излома или с надрезом и точкой скарификатор ампульный не вкладывают.	вой упаковке из плёнки поливинилхлоридной. 1 контурная ячейковая упаковка с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке из картона. 1 флакон с препаратом по 2 г, 2 ампулы с растворителем в контурной ячейковой упаковке из плёнки поливинилхлоридной. 1 контурная ячейковая упаковка с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке из картона. 1 флакон с препаратом по 0,5 г, 1 г, 1 ампула с растворителем с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке или коробке из картона. 1 флакон с препаратом по 2 г, 2 ампулы с растворителем с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке или коробке из картона. 5 флаконов с препаратом в контурной ячейковой упаковке. 1 контурная ячейковая упаковка с препаратом по 0,5 г, 1 г, 1 контурная ячейковая упаковка с 5 ампулами растворителя с инструкцией по применению и скарификатором ампульным в пачке из картона. 1 контурная ячейковая упаковка с препаратом по 2 г, 2 контурные ячейковые упаковки с 5 ампулами растворителя с инструкцией по применению и скарификатором ам-

Старая редакция	Новая редакция
	пульным в пачке из картона. При использовании ампул с кольцом излома или с надрезом и точкой скарификатор ампульный не вкладывают.
Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения.** В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Зам. исполнительного директора ОАО «Синтез» В.И. Петухов

Канцелярия ОАО "Синтез"