


ИНСТРУКЦИЯ**по медицинскому применению препарата****ВИЦЕФ®****Регистрационный номер: Р № 000653/01****Изменение № 1****Срок введения Изменения с «28» 04 ~~2008~~ г.**

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г. 0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл; 2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл. 1 флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г. 0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл; 2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл. Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл. 1. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 2. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем и инструкцию по применению упаковывают в пачку картонную. 3. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без

Старая редакция	Новая редакция
	фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 4. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 5. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.

/ Генеральный директор
ООО «АБОЛмед»


О.М. Карташова

«01» июля 2009 г.