

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Вицеф®

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного

введения, 0.5 г, 1.0 г, 2.0 г

ООО «ПФК «Пребенд», Россия

Изменение № 10

Дата внесения Изменения «___» 12 08 19 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Вицеф®	Торговое наименование: Вицеф®
Международное название препарата: цефтазидим	Международное непатентованное наименование: цефтазидим
Химическое название: пиридин 1-[[7-[[[(2-амино-4-тиазолил)](1-карбокси-1-метилэтокси)имино]ацетил]амино]-2-карбокси-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-3-ил]метил]-, гидроксид внутренняя соль пентагидрат [6R-[6альфа, 7бета (Z)]].	Раздел удален
Состав: один флакон содержит активное вещество: цефтазидима пентагидрат (в пересчете на цефтазидим) 0,5 г 1,0 г 2,0 г вспомогательное вещество:	Состав: состав на 1 флакон: действующее вещество: цефтазидима пентагидрат 0,583 г 1,165 г 2,330 г

натрия карбонат	0,05 г 0,1 г 0,2 г	(в пересчете на цефтазидим)	0,5 г 1,0 г 2,0 г
Форма выпуска		Форма выпуска	
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г.		Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г.	
0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл;		0,5 г или 1,0 г действующего вещества во флаконы стеклянные по 10 мл;	
2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл.		2,0 г действующего вещества во флаконы стеклянные по 20 мл.	
1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.		1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.	
2. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.		2. 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.	
Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл или 10 мл.		Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах стеклянных по 5 мл или 10 мл.	
<u>Для дозировки 0,5 г</u>		<u>Для дозировки 0,5 г</u>	
1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 5 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению		1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем по 5 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению	

вкладывают в пачку из картона.

2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 5 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.

Для дозировки 1,0 г

1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 5 мл или 2 ампулы с растворителем объемом 5 мл, или 1 ампула с растворителем объемом 10 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.

2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 5 мл или 10 ампулами растворителя объемом 5 мл, или 5 ампулами растворителя объемом 10 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую

помещают в пачку из картона.

2. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя по 5 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

Для дозировки 1,0 г

1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем по 5 мл или 2 ампулы с растворителем по 5 мл, или 1 ампулу с растворителем по 10 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

2. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя по 5 мл или 10 ампулами растворителя по 5 мл, или 5 ампулами растворителя по 10 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку или две контурные

упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.

Для дозировки 2,0 г

1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 5 мл или 4 ампулы с растворителем объемом 5 мл, или 2 ампулы с растворителем объемом 10 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.

2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 5 мл или 10 ампулами растворителя объемом 10 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

ячейковые упаковки с растворителем и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

Для дозировки 2,0 г

1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем по 5 мл или 4 ампулы с растворителем по 5 мл, или 2 ампулы с растворителем по 10 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

2. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя по 5 мл или 10 ампулами растворителя по 10 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку или две контурные ячейковые упаковки с растворителем и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года. Не использовать после истечения срока годности.	Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек По рецепту врача.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.

Начальник отдела регистрации
лекарственных средств
ООО «ПФК «Пребэнд»



С.Ю. Клепикова