

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Орзид[®]

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 250 мг, 500 мг, 1 г

лекарственная форма, дозировка

Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.),
Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 2

291215

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 201 г.

Старая редакция	Новая редакция
Передозировка Чаще возникает у больных с почечной недостаточностью. <i>Симптомы:</i> головокружение, парестезии, головная боль, отклонение в результатах лабораторных анализов (увеличение содержания мочевины и сывороточного креатинина в крови, гипербилирубинемия, тромбоцитоз, удлинение протромбинового времени); у пациентов с почечной недостаточ-	Передозировка <i>Симптомы:</i> передозировка может привести к неврологическим осложнениям с развитием энцефалопатии, судорог, комы. <i>Лечение:</i> содержание цефтазида в плазме крови можно уменьшить с помощью гемодиализа или перитонеального диализа. Симптоматическая терапия.

ностью также судороги, энцефалопатия, “порхающий” тремор, кома, нейромышечная возбудимость, миоклония. Поскольку специфический антидот отсутствует, лечение симптоматическое и поддерживающее. У больных с нарушением функции почек, а также в случае тяжелой передозировки, когда консервативная терапия безуспешна, концентрация цефтазидима в крови может быть уменьшена при помощи перитониального диализа или гемодиализа. Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг, 500 мг, 1 г /в комплекте с растворителем (вода для инъекций) или без растворителя/. По 250 мг или 500 мг цефтазидима в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 5 мл воды для инъекций в	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг, 500 мг, 1 г. По 250 мг или 500 мг цефтазидима в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 5 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией
--	--

стеклянную ампулу с линией разлома или ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле из пластика вместе с инструкцией по применению в картонную пачку; по 1 флакону и 1 стеклянной ампуле в контурную ячейковую упаковку, а затем вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).


По 1 г цефтазидима в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 10 мл воды для инъекций в стеклянную ампулу с линией разлома или ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле из пластика вместе с инструкцией по применению в картонную пачку; по 1 флакону и

разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).

По 1 г цефтазидима в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 10 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).

1 стеклянной ампуле в контурную ячейковую упаковку, а затем вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).	
За дополнительной информацией просьба обращаться в Представительство компании Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд. 119421, Москва, ул. Обручева, д. 4, корп. 3, оф. 140. Тел.: (495) 514 10 32 Факс: (495) 514 10 34	За дополнительной информацией и с претензиями по препарату просьба обращаться в Представительство компании Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд. 119421, г. Москва, ул. Обручева, д. 4, корп. 3, оф. 140 Тел.: (495) 514 10 32 Факс: (495) 514 10 34 E-mail: orchid@sovintel.ru

Глава Представительства в РФ



С. В. Масленикова