

МИНЗДРАВ РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

31 08 22

СОГЛАСОВАНО

Цефтидин

**Порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения, 1 г**

АО «Фармасинтез», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « 31 08 22 » 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г. По 1,0 г препарата в стеклянные флаконы типа I (USP/EP) вместимостью от 10 мл до 20 мл герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. По 5 мл или 10 мл растворителя «Вода для инъекций» (РУ ЛП 001844-190912) в полиэтиленовые ампулы. По 1 флакону с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в групповую упаковку. По 1 флакону с препаратом в комплекте с 1 ампулой растворителя по 5 мл/ или по 1 флакону с препаратом в комплекте с 1 ампулой растворителя по 10 мл вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона с перегородкой. Пачки помещают в групповую упаковку.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г. <i>При производстве ООО «Интерфарма», Россия</i> Первичная упаковка По 1,0 г препарата в прозрачные стеклянные флаконы 1-го гидролитического класса, вместимостью от 10 мл до 20 мл, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся. Вторичная упаковка По 1 флакону с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку.

14 2 20 4

От 1 до 100 флаконов с препаратом и с равным количеством инструкций помещают в коробку из картона (для стационаров). Коробки из картона помещают в групповую упаковку. Производитель: АО «Фармасинтез», Россия <i>Юридический адрес:</i> 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3 <i>Адрес производственной площадки:</i> г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184, тел. (3952) 550 - 355, факс 550 - 325 Владелец регистрационного удостоверения: ЗАО «Фармгид», Россия Адрес для приема претензий: ЗАО «Фармгид», 115088, РФ, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 2, офис 304.	Упаковка для стационаров От 1 до 100 флаконов с препаратом и с равным количеством инструкций, помещают в коробку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества (для стационаров). На коробку из картона наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся. Коробки из картона помещают в групповую упаковку. При производстве АО «Фармасинтез», Россия Первичная упаковка По 1,0 г препарата в стеклянные флаконы типа I (USP/EP), вместимостью от 10 мл до 20 мл герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеящиеся. По 5 мл или 10 мл растворителя «Вода для инъекций» (РУ ЛП 001844-190912) в полиэтиленовые ампулы из полиэтилена низкой плотности или из полиэтилена для инфузионных и инъекционных препаратов. На ампулы наносят маркировку принтером в соответствии с маркировкой первичной упаковки. Вторичная упаковка По 1 флакону с препаратом вместе с инструкций по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац или другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку. По 1 флакону с препаратом в комплекте с 1 ампулой растворителя по 5 мл/ или по 1 флакону с препаратом в комплекте с 1 ампулой растворителя по 10 мл вместе с инструкцией по применению помещают в
--	--

Изменение № 3 к инструкции по применению С.3

пачку из картона с перегородкой для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац или другого аналогичного качества с перегородкой. Пачки помещают в групповую упаковку.

Упаковка для стационаров

От 1 до 100 флаконов с препаратом и с равным количеством инструкций помещают в коробку из картона (для стационаров). Коробки из картона помещают в групповую упаковку.

Производитель:

АО «Фармасинтез», Россия

Юридический адрес: 664007,

г. Иркутск, ул. Красногвардейская,
д. 23, оф. 3

Адрес производственной площадки:

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184, тел.
(3952) 550 - 355, факс 550 – 325

ООО «Интерфарма», Россия


300004, Тульская область, г. Тула,
Торховский проезд, дом 8.

**Владелец регистрационного
удостоверения:**


ЗАО «Фармгид», Россия

115088, РФ, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14,
стр. 2, офис 304.

Генеральный директор



Бхусан Бхарат



142204