

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Цефтидин**Порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения, 1 г****АО «Фармасинтез», Россия/ООО «Интерфарма», Россия**

Изменение № 4

250625

Дата внесения Изменения « ____ » ____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г. <i>При производстве ООО «Интерфарма», Россия</i> Первичная упаковка По 1,0 г препарата в прозрачные стеклянные флаконы 1-го гидролитического класса, вместимостью от 10 мл до 20 мл, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся. Вторичная упаковка По 1 флакону с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г. По 1,0 г препарата в прозрачные стеклянные флаконы 1-го гидролитического класса, вместимостью от 10 мл до 20 мл, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся. По 1 флакону с препаратом вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку. Упаковка для стационаров От 1 до 100 флаконов с препаратом и с равным количеством инструкций, помещают в коробку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества (для

Упаковка для стационаров От 1 до 100 флаконов с препаратом и с равным количеством инструкций, помещают в коробку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац, или другого аналогичного качества (для стационаров). На коробку из картона наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся. Коробки из картона помещают в групповую упаковку. При производстве АО «Фармасинтез», Россия Первичная упаковка По 1,0 г препарата в стеклянные флаконы типа I (USP/EP), вместимостью от 10 мл до 20 мл герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с предохранительными пластмассовыми крышечками. На каждый флакон наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеящиеся. По 5 мл или 10 мл растворителя «Вода для инъекций» (РУ ЛП 001844-190912) в полиэтиленовые ампулы из полиэтилена низкой плотности или из полиэтилена для инфузионных и инъекционных препаратов. На ампулы наносят маркировку принтером в соответствии с маркировкой первичной упаковки. Вторичная упаковка По 1 флакону с препаратом вместе с инструкций по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац или другого аналогичного качества. Пачки помещают в групповую упаковку. По 1 флакону с препаратом в комплекте с 1 ампулой растворителя по 5 мл/ или по 1 флакону с препаратом в комплекте с 1 ампулой растворителя по 10 мл вместе с инструкцией по применению помещают в	стационаров). На коробку из картона наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или из полимерных материалов, самоклеящиеся. Коробки из картона помещают в групповую упаковку. Срок годности 3 года. Не использовать по истечении срока, указанного на упаковке. Производитель: ООО «Интерфарма», Россия 300004, Тульская область, г. Тула, Торховский проезд, дом 8. Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей: АО «ФАРМГИД», Россия, 108820, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Киевское, км 21-й, д. 3, стр. 1, помещ. 2/6. Тел. +7 (495) 786-25-18 info@pharmguide.ru
---	--

пачку из картона с перегородкой для потребительской тары подгрупп хромовый или хром-эрзац или другого аналогичного качества с перегородкой. Пачки помещают в групповую упаковку.

Упаковка для стационаров

От 1 до 100 флаконов с препаратом и с равным количеством инструкций помещают в коробку из картона (для стационаров). Коробки из картона помещают в групповую упаковку.

Срок годности

Препарат: 3 года.

Растворитель: 4 года.

Не использовать по истечении срока, указанного на упаковке.

Производитель:

АО «Фармасинтез», Россия

Юридический адрес: 664007,

г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3

Адрес производственной площадки:

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184, тел. (3952) 550 - 355, факс 550 – 325

ООО «Интерфарма», Россия

300004, Тульская область, г. Тула, Торховский проезд, дом 8.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЗАО «Фармгид», Россия

115088, РФ, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 2, офис 304.

Генеральный директор



Бхусан Бхарат