МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Цефсон

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения: 1000 мг, 500 мг; для 500 мг: флаконы/в комплекте с растворителем (ампулы) 2 мл/№1; для 1000 мг: флаконы/в комплекте с растворителем (ампулы) 3,5 мл/№1; флаконы №100

Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш, Турция

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 250112 2011 г.

Старая редакция	Новая редакция
Особые указания При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности, у больных, находящихся на гемодиализе, следует регулярно определять концентрацию препарата в плазме. При длительном лечении необходимо регулярно контролировать картину периферической крови, показатели функционального состояния печени и	**Особые указания** При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности, у больных, находящихся на гемодиализе, следует регулярно определять концентрацию препарата в плазме. При длительном лечении необходимо регулярно контролировать картину периферической крови, показатели

Старая редакция	Новая редакция
почек. В редких случаях при УЗИ желчного пузыря отмечаются затемнения, которые исчезают после прекращения лечения (даже если это явление сопровождается болями в правом подреберье, рекомендуется продолжение назначения антибиотика и проведение симптоматического лечения). Во время лечения противопоказано применение этанола - возможны дисульфирамоподобные эффекты (покраснение лица, спазм в животе и в области желудка, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, тахикардия, одышка). Несмотря на подробный сбор анамнеза, что является правилом и для других цефалоспориновых антибиотиков, нельзя исключить возможность развития анафилактического шока, который требует немедленной терапии - сначала внутривенно вводят	функционального состояния печени и почек. В редких случаях при УЗИ желчного пузыря отмечаются затемнения, которые исчезают после прекращения лечения (даже если это явление сопровождается болями в правом подреберье, рекомендуется продолжение назначения антибиотика и проведение симптоматического лечения). Во время лечения противопоказано применение этанола - возможны дисульфирамоподобные эффекты (покраснение лица, спазм в животе и в области желудка, тошнота, рвота, головная боль, снижение артериального давления, тахикардия, одышка). Несмотря на подробный сбор анамнеза, что является правилом и для других цефалоспориновых антибиотиков, нельзя исключить возможность развития анафилактического шока, который требует немедленной терапии -

Старая редакция	Новая редакция
эпинефрин, затем глюкокортикостероиды. Исследования in vitro показали, что подобно другим цефалоспориновым антибиотикам, цефтриаксон способен вытеснять билирубин, связанный с альбумином сыворотки крови. Поэтому у новорожденных с гипербилирубинемией и, особенно, у недоношенных новорожденных, применение цефтриаксона требует еще большей осторожности. Пожилым и ослабленным больным может потребоваться назначение витамина К. Приготовленный раствор хранить при комнатной температуре не более 6 часов или в холодильнике при температуре 2-8°С не более 24 часов. **Условия хранения:** В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25^{0}С. После приготовления препарат сохраняет активность в течение 14	сначала внутривенно вводят эпинефрин, затем глюкокортикостероиды. Исследования in vitro показали, что подобно другим цефалоспориновым антибиотикам, цефтриаксон способен вытеснять билирубин, связанный с альбумином сыворотки крови. Поэтому у новорожденных с гипербилирубинемией и, особенно, у недоношенных новорожденных, применение цефтриаксона требует еще большей осторожности. Пожилым и ослабленным больным может потребоваться назначение витамина К. Приготовленный раствор хранить при комнатной температуре не более 6 часов или в холодильнике при температуре 2-8°С не более 24 часов. Перед употреблением взболтать. **Условия хранения:** При температуре не выше 25^{0}С, в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Старая редакция	Новая редакция
дней при температуре хранения 2-8^{0}C. Хранить в недоступном для детей месте. **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** «Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш.», Турция. Пак иш Меркези, проф. Др.Булент, Таркан Сокак №5/1, 34349 Гайреттепе, Стамбул, Турция, Тел/факс: +902122757956	**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** «Мустафа Невзат Илач Санаи А.Ш.», Турция. Пак Иш Меркези, проф. Др. Булент. Таркан Сокак №5/1, 34349 Гайреттепе, Стамбул, Турция, Тел/факс: +902122757956 www.mn.com.tr

Представитель фирмы О.Обухова