ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению

ПРЕПАРАТА

**Цикломицин® плюс таблетки,
покрытые пленочной оболочкой**

Регистрационный номер: ЛСР-001130/07

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

Срок введения Изменения с «21» 04 2010 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка содержит: *Активное вещество:* Циклосерина в пересчете на 100 % вещество – 0,25 г, Пиридоксина гидрохлорида в пересчете на 100 % вещество - 0,025 г; *Вспомогательные вещества:* Магния оксид, метакриловой кислоты и метакрилата сополимер, кросповидон, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), магния трисиликат, тальк, магния стеарат. Оболочка: этилцеллюлоза, титана диоксид, тальк, диэтилфталат, пропиленгликоль, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза).	Состав: 1 таблетка содержит: *Активное вещество:* Циклосерина в пересчете на 100 % вещество – 0,25 г, Пиридоксина гидрохлорида в пересчете на 100 % вещество - 0,025 г; *Вспомогательные вещества:* Кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал прежелатинизированный, коповидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кальция стеарат. Оболочка: коповидон, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), Опадрай II (серия 85): поливиниловый спирт частично гидролизованный, макрогол-3350, титана диоксид Е 171, тальк.

Генеральный директор
ОАО «Валента Фармацевтика» С.А. Окуньков

«9» сентября 2009 г.

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА