МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-001130/07- 17 07 17
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Цикломицин® плюс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг + 25 мг

ПАО «Валента Фарм», Россия

Изменение № 6

Дата внесения Изменения «____» 17 07 17 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 таблетка содержит: *активные вещества:* Циклосерин (в пересчете на 100 % вещество) - 250,0 мг, Пиридоксина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) - 25,0 мг; *вспомогательные вещества:* кальция гидрофосфата дигидрат - 19,0 мг, крахмал прежелатинизированный - 45,8 мг, коповидон - 32,6 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 3,8 мг, кальция стеарат - 3,8 мг; *состав оболочки:* коповидон - 1,2 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 2,7 мг, Опадрай II 85F18422 - 16,1 мг: поливиниловый спирт частично гидролизованный - 40,0 %, макрогол-3350 - 20,2 %, тальк - 14,8 %, титана диоксид Е 171 - 25,0 %.	**Состав** 1 таблетка содержит: *действующие вещества:* циклосерин (в пересчете на 100 % вещество) - 250,0 мг, пиридоксина гидрохлорид (в пересчете на 100 % вещество) - 25,0 мг; *вспомогательные вещества:* кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал прежелатинизированный, коповидон, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кальция стеарат; *состав оболочки:* коповидон, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), Опадрай II 85F18422: поливиниловый спирт частично гидролизованный, макрогол-3350, тальк, титана диоксид Е 171.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания: Раздел отсутствует.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Противопоказан к применению в период беременности. Проникает в грудное молоко, при необходи-

Старая редакция	Новая редакция
	мости применения препарата на время лечения следует прекратить грудное вскармливание.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Раздел отсутствует.	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами** Учитывая возможные побочные действия, при приеме препарата следует соблюдать осторожность во время работы водителям транспортных средств и людям, профессия которых требует повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг + 25 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель: ОАО «Валента Фармацевтика», 141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, 2. Тел. (495) 933-48-62, факс (495) 933-48-63.	**Производитель:** ПАО «Валента Фарм» 141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2. Тел. +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63. **Претензии от покупателей принимает предприятие-владелец РУ:** ПАО «Валента Фарм» 141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2. Тел. +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63.

Исполнительный директор
ПАО «Валента Фарм» А.А. Биккенин