



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭНДОКСАН®

Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения,

200 мг, 500 мг, 1000 мг

Бакстер Онкология ГмбХ, Германия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 260121 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска <u>Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг, 500 мг, 1000 мг.</u> По 200 мг, 500 мг или 1000 мг циклофосфамида во флаконах из бесцветного прозрачного стекла тип I или тип III (Евр. Ф.) вместимостью 20 мл, 50 мл или 75 мл, соответственно, укупоренный пробкой из бромбутилкаучука, уплотненной сверху алюминиевым колпачком с отрывающейся пластмассовой крышечкой типа «Flip-off» синего цвета. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.	Форма выпуска <u>Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг, 500 мг, 1000 мг.</u> По 200 мг, 500 мг или 1000 мг циклофосфамида во флаконах из бесцветного прозрачного стекла тип I или тип III (Евр. Ф.) вместимостью 20 мл, 50 мл или 75 мл, соответственно, укупоренные пробкой из бромбутилкаучука, уплотненной сверху алюминиевым колпачком с отрывающейся пластмассовой крышечкой типа «Flip-off» синего цвета для флакона 200 мг, пластмассовой крышечкой типа «Flip-off» красного цвета для флакона 500 мг, пластмассовой крышечкой типа «Flip-off» серого цвета для флакона 1000 мг. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Старший специалист по регистрации продукции

Софронова Е.А.

АО Компания «Бакстер»

