

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИ-КЛИМ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЦИ-КЛИМ®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Цимицифуги даурской корневищ с корнями экстракт.

Лекарственная форма:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав (на одну таблетку)

Активный компонент:

цимицифуги экстракт сухой с содержанием суммы тритерпеновых гликозидов в пересчете на 27-деоксиактеин 2,5 % – 0,02 г.

Вспомогательные вещества ядра:

целлюлоза микрокристаллическая – 0,145 г, крахмал картофельный – 0,055 г, кальция стеарат – 0,0019 г, кремния диоксид коллоидный – 0,0011 г.

Вспомогательные вещества оболочки:

гипромеллоза (Е 464, гидроксипропилметилцеллюлоза) – 0,0035 г, титана диоксид (Е 171) – 0,0015 г, полисорбат-80 (твин 80) – 0,0010 г, макрогол-400 (Е 1521, полиэтиленгликоль 400) – 0,0007 г, краситель железа оксид красный – 0,0002 г, краситель железа оксид коричневый (ФЕРРОНАТ) – 0,0001 г.

Описание:

Круглые таблетки, покрытые оболочкой, двояковыпуклой формы, от розового цвета до розового цвета с коричневым оттенком, характерного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Противоклиматическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: G02CX

Фармакологические свойства

ЦИ-КЛИМ® обладает эстрогеноподобным действием, проявляет седативные свойства, оказывает положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему.

ЦИ-КЛИМ® снижает концентрацию ФСГ и ЛГ, повышает концентрацию эстрадиола, что ведет к устранению ранних климактерических расстройств (психоэмоциональные и вегето-сосудистые нарушения) и отсроченных климактерических расстройств, обусловленных дефицитом эстрогенов.

Терапевтический эффект препарата **ЦИ-КЛИМ®** развивается постепенно и проявляется приблизительно через 2-4 недели лечения.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Вегето-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в пре-, мено- и постменопаузе («приливы», повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменение настроения, апатия и др.).

Расстройства, обусловленные дефицитом эстрогенов в период менопаузы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эстроген-зависимые опухоли, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Нарушение функции печени, эпилепсия, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано в период беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

ЦИ-КЛИМ® принимают внутрь по 1 таблетке (не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости) 2 раза в сутки, по возможности, в одно и то же время суток (утром и вечером).

Длительность лечения определяется врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В редких случаях возможно

появление боли в эпигастральной области и увеличение массы тела.

Передозировка

При случайном применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, могут наблюдаться диспепсия, гастралгия, нарушение функции печени. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В связи с возможностью передозировки не рекомендуется принимать с другими препаратами, содержащими цимицифуги экстракт.

Особые указания

Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев.

При изменении характера менструального цикла, а также при продолжительных или других вновь возникающих жалобах необходимо обратиться к врачу.

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

ЦИ-КЛИМ® не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг.

По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки на основе фольги алюминиевой.

По 1, 2, 3 или 4 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация,
принимаящая претензии от потребителей**

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, тел.
(3854) 39-00-50, 8-800-200-52-52, www.evalar.ru.