

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минздрав России
ЛП - 004301 - 180517

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦИМИЦИКЛИМ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Цимициклим

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Цимицифуги даурской, цимицифуги кистевидной корневищ экстракт

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав на одну таблетку

Действующее вещество

Цимицифуги экстракт сухой — 0,020 г
с содержанием суммы тритерпеновых агликонов
в пересчете на амирин и сухое вещество 1,5 %

Вспомогательные вещества ядра

Лактозы моногидрат — 0,09685 г

Повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный
медицинский, повидон К-17) — 0,00250 г

Магния стеарат	– 0,00120 г
Тальк	– 0,00070 г
<i>Вспомогательные вещества оболочки</i>	
Гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза)	– 0,00192 г
Титана диоксид	– 0,00131 г
Макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000)	– 0,00052 г

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклой формы, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противоклимактерическое средство растительного происхождения.

Код АТХ

[G02CX].

Фармакологические свойства

Обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему, способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов климактерического периода. Терапевтический эффект наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели лечения.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Вегето-сосудистые и психоэмоциональные расстройства в период менопаузы, пре- и постменопаузы («приливы», повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменения настроения, апатия и др.).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эстроген-зависимые опухоли, беременность, период грудного вскармливания, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Нарушение функции печени, эпилепсия, заболевания и травмы головного мозга.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2 раза в день в одно и то же время суток (утром и вечером). Таблетки следует проглатывать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Длительность лечения определяется врачом.

Побочное действие

Аллергические реакции.

В редких случаях возможно появление боли в эпигастральной области и увеличение массы тела. Очень редко появляются чувство напряжения в молочных железах и менструальноподобные кровотечения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев.

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При изменении характера менструального цикла, а также при продолжительных или других вновь возникающих жалобах необходимо обратиться к врачу.

Больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов, необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,114 г углеводов (0,0095 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг. По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 2, 4 или 6 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки по 20 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл.,
Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.

Генеральный директор
ЗАО «ВИФИТЕХ»



С.А. Постельников
ФИО