

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Присыпка детская

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Присыпка детская

Международное непатентованное или группировочное наименование: цинка оксид

Лекарственная форма: порошок для наружного применения.

Состав

100 г содержат:

Действующее вещество:

Цинка оксид – 10 г

Вспомогательные вещества:

Крахмал картофельный – 10 г

Тальк – 80 г

Описание: белый или серовато-белый, мягкий, жирный на ощупь порошок. При растирании между ладонями не должно ощущаться крупинок, комочков.

Фармакотерапевтическая группа: препараты со смягчающим и защитным действием; препараты цинка.

Код АТХ: D02AB

Фармакологические свойства

Присыпка детская оказывает адсорбирующее, подсушивающее и вяжущее действие. Уменьшает экссудацию и мокнутие, снимает и предупреждает раздражение и воспаление кожных покровов.

Показания к применению

«Пеленочная сыпь», дерматиты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к цинка оксиду и компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания. Не наносить на раневую поверхность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Перед применением препарата, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, или в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно в виде присыпки. Для профилактики опрелостей у детей присыпку детскую наносят на участки тела, находящиеся в длительном контакте с мокрым бельем. При дерматитах присыпку наносят тонким слоем на пораженные участки кожи.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

При повышенной чувствительности к препарату возможны зуд, гиперемия, сыпь.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлено.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. Следует избегать прямого или продолжительного вдыхания препарата. Сообщалось о случаях повреждения легких (в том числе серьезных) при непреднамеренном вдыхании большого количества порошка детских присыпок и других содержащих тальк средств или их длительном ингаляционном воздействии. При попадании большого количества препарата в дыхательные пути взрослого или ребенка следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Порошок для наружного применения.

По 2 г и 5 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного; материала комбинированного «Буфлен» или ламинированная бумага.

По 3, 5, 10, 20 или 30 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац для складных коробок, или из картона хром-эрзац макулатурного.

По 40 г и 50 г в банки из полимера высокого или низкого давления в комплекте с крышками, в банки, флаконы, флаконы-капельницы из полимера высокого или низкого давления со средствами укупорочными или в банки, флаконы из полиэтилентерефталата со средствами укупорочными.

Каждую банку, флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного для потребительской тары или из картона хром-эрзац для складных коробок, или из картона хром-эрзац макулатурного.

Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

По 50, 100, 200, 400 пакетов без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

По 30 или 40 банок, флаконов, флаконов-капельниц без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

На каждый флакон, флакон-капельницу, банку, коробку наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной, или самоклеящуюся этикетку.

Срок годности

5 лет. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения:

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

E-mail: ivff@yandex.ru

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

E-mail: ivff@yandex.ru