

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Цинковая паста**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Цинковая паста**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Цинка оксид**Лекарственная форма:** паста для наружного применения**Состав****100 г препарата содержат:***Действующее вещество:*

Цинка оксид 25,0 г

Вспомогательные вещества:

Крахмал картофельный 25,0 г

Вазелин 50,0 г

Описание: однородная паста от белого до белого с желтоватым оттенком цвета**Фармакотерапевтическая группа:** препараты со смягчающим и защитным действием; препараты цинка.**Код АТХ:** D02AB**Фармакологические свойства**

Противовоспалительное средство для наружного применения, оказывает антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие. При использовании у детей помогает предупредить появление «пеленочной» сыпи, защищает от действия мочи и других раздражающих веществ и смягчает раздраженную кожу. Уменьшает экссудацию и мокнутие, что снимает местные явления воспаления и раздражения. Симптоматический и защитный эффект препарата определяется цинка оксидом. Цинка оксид в сочетании с вазелиновой основой создает физический барьер, образуя защитное покрытие на коже, которое уменьшает воздействие раздражающих веществ на пораженную область и предупреждает появление сыпи.

Показания к применению

Фотоконтактный дерматит. Лечение и профилактика «пеленочной» сыпи. Препарат используют также как средство первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги, порезы, царапины, опрелости).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к цинка оксиду и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.

«Пеленочная» сыпь у детей грудного возраста

Вымыть и высушить поврежденную область. Нанести пасту тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день. Курс лечения – до 1 мес. Количество наносимой пасты зависит от обширности очага поражения. Для профилактики «пеленочной» сыпи препарат наносят на кожу, покрываемую пеленкой или подгузниками, до начала появления признаков раздражения, особенно перед сном, когда ребенок может долгое время находиться в длительном контакте с мокрым бельем.

Порезы, царапины и ожоги

Наносят тонким слоем, при необходимости накладывают марлевую повязку. Наносят только на поверхность и неинфицированные поражения.

Фотоконтактный дерматит

Препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 4-6 раз в день, предварительно обработав трещины и корочки антисептическим раствором.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем указаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны реакции повышенной чувствительности к препарату: зуд, гиперемия, аллергические реакции в местах нанесения пасты.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Неизвестно.

Особые указания

Паста предназначена только для наружного применения, не допускать попадания в глаза.

Пасту не следует наносить при наличии инфекции на местах поражения кожи.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и

быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Паста для наружного применения, 25 %

По 15 г, 20 г, 25 г или 30 г в банки темного стекла типа БТС, укупоренные крышками полиэтиленовыми, натягиваемыми с уплотняющим элементом из полиэтилена высокой плотности. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

По 25 г и 30 г в тубы алюминиевые, покрытые лаком, укупоренные бушоном из полиэтилена низкого давления.

Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (туба и банка в пачке), при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии от потребителя

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru