

И Н С Т Р У К Ц И Я
по медицинскому применению препарата
(информация для специалистов)
ЦИНКА СУЛЬФАТ - ДИА

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: ЦИНКА СУЛЬФАТ – ДИА

Международное (непатентованное) название: цинка сульфат

Химическое название: цинка сульфат

Лекарственная форма: капли глазные

Состав: 1 мл содержит

активное вещество: цинка сульфат – 2,5 мг;

вспомогательные вещества: борная кислота, вода очищенная.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое и вяжущее средство.

Код АТХ: S01XA

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Ион цинка участвует в метаболизме и стабилизации клеточных мембран, влияет на процессы регенерации, входит в состав основных ферментов, участвует в различных биохимических реакциях.

Противомикробная активность ионов цинка связана с их способностью коагулировать белки микроорганизмов с образованием альбуминатов. В зависимости от глубины проникновения развивается подсушивающий и вяжущий эффект. Препарат оказывает также местное противовоспалительное действие.

Показания к применению

- конъюнктивит;
- блефарит;
- профилактика бактериальной инфекции при попадании инородного тела в конъюнктивальную полость;

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, синдром «сухого глаза», беременность, период кормления грудью.

Способ применения и дозы

По 1-2 капли в конъюнктивальную полость 2-4 раза в день. Курс лечения 5-14 дней в зависимости от назначения врача.

Побочные эффекты

Иногда возникает покраснение слизистой оболочки глаза и боль в глазах. Если эти явления длятся более 3 дней, необходима повторная консультация врача.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Форма выпуска

По 5 или 10 мл Цинка сульфата-ДИА капли глазные 0,25% в стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками и обкатанных алюминиевыми колпачками, либо по 5 или 10 мл во флаконах полиэтиленовых или полипропиленовых, герметизированных капельницами и навинчиваемыми крышками.

1 флакон стеклянный в комплекте с крышкой-капельницей или без нее вместе с инструкцией по применению в картонной пачке или в контурной ячейке, упакованной в термосклеиваемый пакет.

1 флакон полимерный вместе с инструкцией по применению в картонной пачке или в контурной ячейке, помещенной в термосклеиваемый пакет.

50 флаконов стеклянных или полимерных вместе с 10 инструкциями по применению в картонной коробке (для стационара).

Срок годности

2 года 6 месяцев.

Срок годности после вскрытия флакона стеклянного – 14 дней, полимерного – 21 день.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25° С, в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача.

Адрес производителя и предъявления претензий:

ЗАО «Институт молекулярной диагностики «ДИАФАРМ»

140009, Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 20А.

Тел/факс: 500-18-28, 500-18-38.

Генеральный директор
ЗАО «Институт молекулярной
диагностики «ДИАФАРМ»



Л.А.Травина

