МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-003930-010917
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Квинель®

раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл, 250 мг/мл

АО «ВЕРОФАРМ», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения "__"_____ 010917 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл (500 мг/4 мл) и 250 мг/мл (1000 мг/4 мл). По 4 мл в ампулы нейтрального стекла вместимостью 5 мл. По 3 или 5 ампул в коробку или пачку из картона с перегородками или вкладышем из бумаги. По 3 или 5 ампул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или без фольги. 1 контурную ячейковую упаковку по 3 или 5 ампул, или 2 контурные ячейковые упаковки по 5 ампул помещают в пачку из картона. В каждую коробку или пачку вкладывают инструкцию по применению и нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный. При использовании ампул с насечками	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 125 мг/мл (500 мг/4 мл) и 250 мг/мл (1000 мг/4 мл). По 4 мл в ампулы вместимостью 5 мл. По 3 или 5 ампул в коробку или пачку из картона с перегородками или вкладышем из бумаги. По 3 или 5 ампул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной или без фольги. 1 контурную ячейковую упаковку по 3 или 5 ампул, или 2 контурные ячейковые упаковки по 5 ампул помещают в пачку из картона. В каждую коробку или пачку вкладывают инструкцию по применению и нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный. При использовании ампул с насечками или кольцом разлома скарификатор ампульный

Старая редакция	Новая редакция
или кольцом разлома скарификатор ампульный или нож для вскрытия ампул не вкладывают.	или нож для вскрытия ампул не вкладывают.

Начальник Управления
по клиническим исследованиям
и регуляторной деятельности Г.А. Кузнецова