

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Цитохром С

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Цитохром С

Международное непатентованное или группировочное наименование: цитохром С

Лекарственная форма: капли глазные

Состав

1 мл содержит:

Действующее вещество: цитохром С¹ – 2,5 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид – 8,5 мг, вода для инъекций – до 1,0 мл

¹ – получено из сердец крупного рогатого скота, лошадей и свиней

Описание

Прозрачная красновато-коричневого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые в офтальмологии; другие средства, применяемые в офтальмологии

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства

Метаболическое средство, оказывает антигипоксическое, трофическое действие, стимулирует процессы регенерации. Является катализатором клеточного дыхания.

Фармакодинамика

Механизм действия препарата связан с наличием в простетической группе железа, способного переходить из окисленного состояния в восстановленное. В результате ускоряются эндогенные окислительно-восстановительные реакции и обменные процессы в тканях, улучшается утилизация кислорода.

Фармакокинетика

При местном применении цитохром С не всасывается в системный кровоток, в организме метаболизируется полностью. Распад цитохрома С идет по тем же метаболическим путям, что и расщепление аминокислот, а гем, расщепленный до билирубина, выводится с желчью.

Показания к применению

Лекарственный препарат Цитохром С показан к применению в комплексной терапии у взрослых с 18 лет при дистрофии роговицы (первичной и вторичной), помутнении роговицы, кератите (в стадии эпителизации).

Противопоказания

Детский возраст до 18 лет. Гиперчувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Местно, в виде инстилляций в конъюнктивальную полость.

По 1 – 2 капли в конъюнктивальный мешок 3 – 4 раза в сутки.

Длительность применения препарата в составе комплексной терапии устанавливается лечащим врачом в зависимости от эффективности терапии.

Побочное действие

Аллергические реакции, конъюнктивальная инъекция, кратковременное жжение в глазу.

Передозировка

Данные отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При использовании других офтальмологических лекарственных препаратов одновременно интервал между их введением должен быть не меньше 10 – 15 минут.

При совместном применении препарата с другими средствами для местного применения в офтальмологии глазные мази необходимо применять в последнюю очередь.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Пациенты, у которых после закапывания препарата появляется кратковременное жжение глаз, не должны управлять транспортными средствами и механизмами сразу после применения глазных капель.

Форма выпуска

Капли глазные 0,25 %.

По 2 мл во флаконы стеклянные вместимостью 5 мл, укупоренные пробками резиновыми медицинскими, обкатанные колпачками алюминиевыми или обжатые колпачками комбинированными из алюминия с пластмассовой крышкой.

1 флакон с крышкой-капельницей и инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 4 до 20 °С.

Вскрытый флакон хранить в холодильнике не более 3-х суток в закрытом виде.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Самсон-Мед», Россия,

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, литер ВА;

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, литер ВИ;

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13, литер ВЛ.

**Держатель регистрационного удостоверения / организация, принимающая претензии
потребителя**

ООО «Самсон-Мед», Россия,

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13,

тел. 8 800 1000 554, факс 8 812 7024 592.