

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СТИМОЛ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СТИМОЛ®

Международное непатентованное или группировочное наименование:

цитруллина малат

Лекарственная форма: раствор для приёма внутрь

Состав:

1 пакетик содержит:

Действующее вещество: цитруллина малат 1,00 г.

Вспомогательные вещества: натуральный ароматизатор апельсина сангрия,
раствор натрия гидроксида 30 %, вода очищенная.

Описание: бесцветная или желтоватая жидкость с запахом апельсина.

Фармакотерапевтическая группа: общетонизирующее средство.

Код АТХ: A13A

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает противоастеническим действием, а также способствует детоксикации печени.

Цитруллин – аминокислота, участвующая в протекающем в печени цикле нейтрализации аммиака, образующегося в результате распада азотсодержащих соединений. В печени из аммиака образуется мочевины. Цитруллин встраивается в цикл мочевины, повышает выведение ионов аммония.

Малат вовлекается в цикл Кребса и глюконеогенез, снижает концентрацию лактата в крови, способствует нормализации обмена веществ, активизирует неспецифические защитные факторы организма.

Фармакокинетика

Абсорбция: препарат быстро всасывается из ЖКТ, пик плазменной концентрации достигается в среднем через 50 минут.

Распределение: быстро выводится из плазмы. Через 6 часов концентрация в плазме близка к физиологической.

Биотрансформация/ Элиминация: так как активный компонент включается в процессы клеточного метаболизма, то лишь небольшие его количества обнаруживаются в моче.

Показания к применению

Применяют при симптоматическом лечении функциональной астении:

- астеническом синдроме;
- переутомлении;
- повышенной усталости;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания

- язвенная болезнь в стадии обострения;
- повышенная индивидуальная чувствительность к препарату;
- детский возраст менее 5 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение СТИМОЛ® при беременности и в период грудного вскармливания оправдано в том случае, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Способ применения и дозы

Взрослые и лица пожилого возраста: 3,0 г (содержимое 3-х пакетиков) в день.

Дети с 5 лет: 2,0 г (содержимое 2-х пакетиков) в день.

СТИМОЛ® следует принимать во время еды, смешивая содержимое пакетика с примерно 100 мл воды обычной или подслащенной. Курс приема препарата 10-12 дней. Повторные курсы возможны после перерыва (1-3 месяца) или по рекомендации врача.

Побочное действие

Резюме нежелательных реакций

В соответствии с классификацией ВОЗ все реакции распределены по системам органов и частоте встречаемости согласно классификации Медицинского словаря для нормативно-правовой деятельности (MedDRA): очень часто ($\geq 1/10$); часто (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$); нечасто (от $\geq 1/1000$ до $< 1/100$); редко (от $\geq 1/10000$ до $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

В некоторых случаях в начале лечения могут возникать преходящие боли в области желудка, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Данные о каких-либо лекарственных взаимодействиях отсутствуют.

Особые указания

С осторожностью

В каждой упаковке содержится примерно 30 мг натрия. Это следует принимать во внимание пациентам, находящимся на бессолевой диете.

Поскольку в составе препарата нет сахара, его можно принимать больным сахарным диабетом.

Форма выпуска

Раствор для приёма внутрь, 100 мг/мл.

По 10 мл в пакетики из бумажно-полиэтилено-алюминиевого комплекса.

18 пакетиков вместе с инструкцией по применению помещают в коробку картонную.

Возможно наличие контроля первого вскрытия.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Препарат не следует использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Франция,

Biocodex,

22 Rue des Aqueducs, 94250 Gentilly, France.

Тел.: +33 1 41 24 30 00

Факс: +33 1 41 24 30 04

Адрес электронной почты: medinfo@biocodex.fr

Производитель

Франция,

Biocodex,

1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, France.

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «БИОКОДЕКС»,

127051, г. Москва, б-р Цветной, д. 2.

Тел.: +7(495)783-26-80

E-mail: phv@biocodex-corp.ru

Адрес в сети Internet: www.biocodex.ru