МИНЗДРАВ РОССИИ
Л N011411/01-210616
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ШАЛФЕЙ

таблетки для рассасывания

Херкель Б.В., Нидерланды

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 210616 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название: Шалфей	**Торговое наименование: Шалфей**
Состав на одну таблетку:	**Состав на одну таблетку:**
Активные вещества:	*Активные вещества:*
Шалфея экстракт сухой 12,50 мг	Шалфея экстракт сухой 12,50 мг
Шалфея масло эссенциальное 2,40 мг	Шалфея масло эссенциальное 2,40 мг
Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота – 8,000 мг, яблочная кислота – 1,769 мг, сорбит – 1086,771 мг, аспартам – 3,538 мг, магния стеарат – 25,000 мг, кремния диоксид коллоидный – 3,000 мг, ароматизатор медовый – 0,664 мг, хинолиновый жёлтый Е-104 – 1,930 мг, индигокармин Е-132 – 4,428 мг.	*Вспомогательные вещества:* аскорбиновая кислота, яблочная кислота, сорбит, аспартам, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, ароматизатор медовый, хинолиновый жёлтый Е-104, индигокармин Е-132.
Противопоказания:	**Противопоказания:**
Повышенная индивидуальная	Повышенная индивидуальная

чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 5 лет, острый нефрит.	чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 5 лет, острый нефрит, непереносимость фруктозы; фенилкетонурия.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции.	**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.
Передозировка: До настоящего времени случаев передозировки не отмечалось.	**Передозировка:** До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.
	Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Прием препаратов шалфея может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременное применение с данными лекарственными средствами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие

	других лекарственных средств и алкоголя. Лекарственное средство может влиять на всасывание железа и других минералов. **Особые указания:** При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5-7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу. **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:** Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами)
Условия отпуска из аптек: Без рецепта	**Условия отпуска:** Без рецепта

Директор по регистрации в России
и странах СНГ ООО «ВАЛЕАНТ» Т.В. Козлова