

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

ШИПОВНИКА МАСЛО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Шиповника масло

**Международное непатентованное или группировочное
наименование:** шиповника плодов масло

Лекарственная форма: масло для приема внутрь, местного и наружного
применения

Состав: шиповника плодов масло

Характеристика:

Шиповника масло содержит жирорастворимые витамины (каротиноиды, витамины К, Е), жирные кислоты и другие биологически активные вещества.

Описание

Маслянистая жидкость оранжевого цвета с характерным запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при температуре 40 °С.

Фармакотерапевтическая группа

Репарации тканей стимулятор растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Стимулирует процессы регенерации кожи и слизистых оболочек. Фармакологическое действие масла шиповника обусловлено наличием в нем ненасыщенных жирных кислот (линоленовой и линолевой), витамина Е и каротиноидов.

Показания к применению

МИНЗДРАВ РОССИИ
РN002894/01- 180422
СОГЛАСОВАНО

Шиповника масло применяют наружно при неглубоких трещинах и ссадинах сосков у кормящих женщин, пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, местно – при озене, язвенном колите (в комплексной терапии). При дерматозах, наряду с наружным применением, масло шиповника применяют внутрь.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

При применении внутрь – беременность, детский возраст до 12 лет, тромбоз, тромбофлебит, калькулезный холецистит.

Способы применения и дозы

Наружно

При лечении трещин и ссадин сосков молочных желез у кормящих женщин марлевые салфетки, смоченные маслом шиповника, накладывают на соски на 20-30 мин после каждого кормления ребенка в течение 4-5 дней. Перед кормлением ребенка необходимо смыть масло с сосков молочных желез.

При лечении пролежней и трофических язв голени и стоп на очаг поражения накладывают марлю, пропитанную маслом шиповника, затем её закрывают вощеной бумагой. Повязку фиксируют бинтом. Смена повязки проводится 1 раз в день или 1 раз в 2 дня по рекомендации врача. Курс лечения – 15-20 дней.

Наружно и внутрь

При лечении дерматозов на пораженные участки кожи 2-3 раза в день накладывают марлевую салфетку, пропитанную маслом шиповника, под окклюзионную повязку. Кроме того, препарат принимают внутрь у взрослых и детей старше 12 лет по 1 чайной ложке 2 раза в день. Курс лечения – 1-2 месяца.

Местно

При озене в полость носа 2 раза в день вводят тампоны, пропитанные маслом шиповника. Курс лечения – 20-30 дней.

В комплексной терапии язвенного колита масло шиповника вводят в прямую кишку с помощью клизмы по 50 мл ежедневно или через день. Курс лечения – 15-30 процедур.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

При длительном применении внутрь возможно повышение свертываемости крови.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении внутрь – диарея. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При приеме шиповника масла внутрь - при одновременном применении с антикоагулянтами возможно снижение их эффективности.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Шиповника масло проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Нет сведений о проникновении в грудное молоко. Неблагоприятных воздействий на плод во время беременности при наружном применении, а также в период грудного вскармливания не выявлено.

Применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Применение препарата при наружном и местном применении при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Масло для приема внутрь, местного и наружного применения.

По 50 мл во флаконы темного стекла с колпачками-крышками.

Каждый флакон темного стекла вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается полный текст инструкции выносить на пачку без вложения инструкции.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

тел.: (3854) 338-719, 326-948

факс (3854) 326-943

/ Генеральный директор
АО «Алтайвитамины»



Балушкин А.Ф.