

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ШИПОВНИКА СИРОП

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Шиповника сироп

Международное непатентованное или группировочное наименование: Шиповника плодов экстракт + [Аскорбиновая кислота]

Лекарственная форма: сироп

Состав

100 г препарата содержат:

Активные компоненты

Шиповника плодов экстракт жидкий (0,55 : 1) — 31,8 г

Аскорбиновая кислота — 0,3 г

Вспомогательные вещества

Сахароза — 67,7 г

Лимонной кислоты моногидрат — 0,2 г

Описание

Густая однородная жидкость от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Витамины; аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации; аскорбиновая кислота (витамин С), комбинации.

Код АТХ

A11GB.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Способствует повышению неспецифической резистентности организма, усилению регенерации тканей, уменьшению проницаемости сосудов, участвует в углеводном и минеральном обмене, обладает желчегонными свойствами. Фармакологические

свойства препарата обусловлены наличием аскорбиновой кислоты и других веществ (каротиноидов, флавоноидов, органических кислот и др.), входящих в его состав.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Профилактика гиповитаминоза витамина С.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к активным компонентам или к любому из вспомогательных веществ, холелитиаз, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 2 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1-2 столовые ложки (15-30 мл) сиропа 2-3 раза в день;

детям от 6 до 12 лет – по 1 десертной ложке (10 мл) сиропа 2-3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 2-3 раза в день;

детям от 2 до 3 лет – по ½ чайной ложки (2,5 мл) сиропа 2-3 раза в день.

Курс лечения – 15-30 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Вследствие наличия в препарате аскорбиновой кислоты возможно: повышение всасывания лекарственных средств группы пенициллина, тетрациклина и железа; снижение клинического эффекта гепарина и непрямых антикоагулянтов; увеличение риска развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами; замедление выведения почками кислот, в том числе ацетилсалициловой кислоты; увеличение выведения лекарственных средств, имеющих щелочную реакцию, в том числе алкалоидов; снижение концентрации в крови пероральных контрацептивов.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Шиповника сироп проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат содержит углеводы, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом, а также при гипокалорийной диете.

В 1 чайной ложке (5 мл) сиропа содержится около 4,6 г сахарозы (0,38 ХЕ), в 1 столовой ложке (15 мл) – около 13,8 г сахарозы (1,15 ХЕ).

При одновременном применении Шиповника сиропа с другими поливитаминными препаратами следует учитывать содержание в его составе аскорбиновой кислоты во избежание возможной передозировки.

Может быть вреден для зубов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Сироп.

По 135 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми белого цвета из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 135 г или 340 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 340 г в бутылки оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 135 г во флаконы из полиэтилентерефталата коричневого цвета с колпачками из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон или бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

36 флаконов по 135 г или 16, 24 флакона или бутылки по 340 г вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку или в ящик из картона (для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.