

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ПЕКТУСИН

**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Пектусин**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Эвкалипта листьев масло + [Левоментол]**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания**Состав на одну таблетку***Действующие вещества*

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Левоментол<br>(L-ментол)                        | — 0,0040 г |
| Эвкалипта листьев масло<br>(Эвкалиптовое масло) | — 0,0005 г |

*Вспомогательные вещества*

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Сахароза                                                     | — 0,6745 г |
| Целлюлоза микрокристаллическая                               | — 0,0799 г |
| Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы<br>(кармеллоза натрия) | — 0,0134 г |
| Тальк                                                        | — 0,0200 г |
| Кальция стеарат                                              | — 0,0077 г |

**Описание**

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом. На поверхности таблеток допускаются более темные и более светлые вкрапления.

**Фармакотерапевтическая группа**

Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

**Код АТХ**

R07AX.

**Фармакологическое действие**

Обладает слабым противомикробным и противовоспалительным действием.

### **Показания к применению**

Применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к левоментолу (L-ментол) и эвкалипта листьев маслу (эвкалиптовое масло) или к любому из вспомогательных веществ. Детский возраст до 8 лет.

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

### **С осторожностью**

Сахарный диабет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В связи с отсутствием опыта применения во время беременности и в период грудного вскармливания назначение препарата данной группе пациентов не рекомендовано.

### **Способ применения и дозы**

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослым – по 1 таблетке 3-4 раза в день; детям старше 8 лет – по 1-2 таблетке в день.

Длительность лечения 5 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

### **Особые указания**

Информация для пациентов с сахарным диабетом: в разовой дозе препарата (1 таблетка) содержится около 0,75 г углеводов, что соответствует 0,0625 ХЕ, в максимальной суточной дозе (4 таблетки) – около 3,0 г углеводов, что соответствует 0,25 ХЕ.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

100 или 200 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона коробочного или в ящик из картона гофрированного (для стационаров).

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимаю-  
щая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru