

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Хлорофиллипт®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Хлорофиллипт®

Международное непатентованное или группировочное наименование: эвкалипта
листьев экстракт

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь, местного и наружного применения
спиртовой

Состав на 1 мл препарата:

Активный компонент: хлорофиллипт экстракт густой, в пересчете на сухое вещество - 10
мг.

Вспомогательное вещество: спирт этиловый (этанол) 96 % - до 1 мл.

Описание: жидкость темно-зеленого цвета с характерным запахом. В процессе хранения
допускается выпадение осадка, образующего налет на стенках и на дне флакона.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии

Код АТХ: D11AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Эвкалипта листьев экстракт - смесь хлорофиллов, получаемая из листьев эвкалипта.
Препарат оказывает антибактериальное (бактериостатическое и бактерицидное) действие,
особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов.
Оказывает противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных
стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами; ожоги, долго
незаживающие раны и трофические язвы конечностей; эрозия шейки матки; для

профилактики послеоперационных осложнений, а также для санации кишечника при стафилококковом носительстве.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к экстракту листьев эвкалипта и/или любому из вспомогательных веществ.
- При приеме внутрь – возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания, заболевания печени, черепно-мозговая травма, алкоголизм, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение внутрь противопоказано. Возможно наружное и местное применение, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат назначают внутрь, местно, наружно. Детям до 18 лет препарат назначают местно и наружно.

Внутрь. При применении у взрослых при кишечном носительстве стафилококков по 5 мл 1 % спиртового раствора, разведенного 30 мл воды, 3 раза в день за 40 минут перед едой ежедневно в течение 2-3 недель.

Местно. При кишечном носительстве стафилококков препарат Хлорофиллипт® назначают также ректально в клизме (по 20 мл 1 % спиртового раствора разводят в 1 л воды - это доза для одной клизмы). Клизму с препаратом ставят через каждые два дня. Детям в объеме (в мл), соответствующем возрасту. Курс лечения состоит из 10 процедур.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки и эрозию 1 % спиртовым раствором препарата Хлорофиллипт®, разведенным 1:10. Манипуляцию проводят в течение 10 дней ежедневно, после чего пациентка должна спринцеваться раствором препарата (1 столовая ложка 1 % спиртового раствора на 1 л воды). Курс лечения - 2 недели. При неполной эпителизации курс лечения повторяют.

Наружно, при лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв, 1 % спиртовой раствор Хлорофиллипта® разводят 0,25 % раствором новокаина в соотношении

1:5 и используют в виде пропитанных этим раствором марлевых повязок. Курс лечения составляет 2-3 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции (отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при правильном применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода, препарат Хлорофиллипт® выпадает в осадок, поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее следует удалить стерильным изотоническим раствором натрия хлорида.

Особые указания

Независимо от выбранного способа применения определяют чувствительность к хлорофиллипту, для чего пациент выпивает 25 капель препарата, растворенного в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч признаков аллергии (отечность губ, слизистой зева и др.) препарат можно применять.

При применении внутрь содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 3,8 мг, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата 11,4 мг.

При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей, эрозии шейки матки) процедуры можно чередовать с применением 2 % масляного раствора хлорофиллипта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

При применении препарата внутрь следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения спиртовой 1 %.

По 25, 50 мл препарата во флаконы светозащитного стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками с полиэтиленовыми крышками навинчиваемыми или с полиэтиленовыми крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия и защитой от случайного вскрытия, а также допускается использование полиэтиленовых крышек без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Арт-Фарм»

Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 6

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. (8332) 22-01-26

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Арт-Фарм»

Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, дом 17-23, этаж 6

Тел./факс: 8-495-640-20-02; +7-967-054-36-98

E-mail: Vladislav.Gorbunov@art-pharm.ru