

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ХЛОРОФИЛЛИПТ®**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Хлорофиллипт®**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Эвкалипта
листьев экстракт**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания**Состав на одну таблетку***Активный компонент*

Хлорофиллипт (Эвкалипта листьев экстракт) экстракт густой в пересчете на сухое вещество с антибактериальной активностью в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды	— 0,025 г
--	-----------

Вспомогательные вещества

Сахар (сахароза)	— 0,617 г
Целлюлоза микрокристаллическая	— 0,120 г
Лимонной кислоты моногидрат	— 0,030 г
Кальция стеарат	— 0,008 г

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской от светло-зеленого до зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство растительного происхождения.

Код АТХ

D06BX.

Фармакологические свойства*Фармакодинамика*

Обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) действием, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Оказывает противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

В комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Местно. По 1 таблетке 5 раз в день через 30-40 мин после еды. Максимальная суточная доза – 5 таблеток. Таблетки следует рассасывать во рту до полного растворения, не разжевывая. Длительность лечения 7 дней.

Побочное действие

Представленные ниже возможные нежелательные реакции распределены по системно-органным классам с указанием частоты их возникновения: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$, но $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$, но $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции (частота неизвестна).

Общие нарушения и реакции в месте введения: местнораздражающее действие на слизистую оболочку полости рта (частота неизвестна).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки хлорофиллипта при местном применении до настоящего времени не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Перед началом лечения необходимо сделать тест на чувствительность пациента к лекарственному препарату. При отсутствии через 6-8 часов аллергических реакций после приема одной таблетки, можно начинать курсовое лечение.

Для избежания местнораздражающего действия препарата на слизистую оболочку полости рта не следует держать таблетку под языком или за щекой, а рекомендуется активно рассасывать ее в полости рта (не более 30 минут).

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится 0,617 г углеводов (0,051 ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Хлорофиллипт не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания 25 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, пос. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.

**Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии
потребителя**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.