МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ХЛОРОФИЛЛИН-ОЗ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Хлорофиллин-ОЗ

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения (масляный)

Состав: 1 мл раствора содержит хлорофиллипта экстракт густой (в пересчете на 100% содержание сухого вещества) – 0,02 г;
вспомогательные вещества: оливковое масло – до 1 мл.

Описание: прозрачная темно-зеленая маслянистая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: Противомикробное средство растительного происхождения.
КОД АТХ D06BX

Фармакологические свойства

Хлорофиллин-ОЗ - смесь хлорофиллов, получаемая из листьев эвкалипта. Препарат оказывает антибактериальное (бактериостатическое и бактерицидное) действие, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Хлорофиллин-ОЗ также обладает противовоспалительными свойствами.

Показания к применению

В комплексном лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей; эрозия шейки матки; в период грудного вскармливания для предупреждения трещин сосков.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности противопоказано. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно после согласования с врачом.

Способ применения и дозы

Применяют местно.

При лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей хлорофиллин-ОЗ используют в виде пропитанных масляным раствором марлевых повязок. Процедуру можно чередовать с применением 1% спиртового раствора хлорофиллина-ОЗ, разведенного 0,25% раствором новокаина в соотношении 1:5. Курс лечения – 2-3 недели.

При лечении эрозий шейки матки предварительно осушают тампонами все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и масляным раствором хлорофиллина-ОЗ смазывают канал шейки матки. Смоченный в препарате тампон оставляют на шейке матки на 15-20 минут. Манипуляции проводят в течение 10 дней ежедневно. В дальнейшем, на протяжении 2-х недель, после каждого спринцевания тампон, обильно смоченный масляным раствором хлорофиллина-ОЗ оставляют во влагалище на 12 часов. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

С целью предупреждения трещин сосков у кормящих матерей смазывают соски после каждого кормления ребенка. Перед началом следующего кормления препарат тщательно смывают кипяченой водой.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

При превышении рекомендованных доз возможно усиление побочного действия.

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нужно учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода хлорофиллин-ОЗ выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее должны быть удалены стерильным изотоническим раствором хлорида натрия.

Особые указания

При лечении эрозии шейки матки для спринцевания используют 1% спиртовой раствор хлорофиллина-ОЗ, разведенный в соотношении: 1 столовая ложка спиртового раствора на 1 л воды.

До лечения необходимо проверить чувствительность больного к препарату путем местной аппликации небольшого количества препарата. При отсутствии через 6-8 часов аллергических реакций (гиперемия, зуд) можно назначить курсовое лечение препаратом, при наличии аллергических реакций препарат противопоказан.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, работа с движущимися механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения (масляный) 2 %.

По 20 мл во флаконах из оранжевого стекла, вложенных вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения: ООО «Опытный завод «ГНЦЛС». 61057, Украина, г. Харьков, ул. Воробьева, 8.

Тел/факс: (8057) 731-29-03.

Производитель: ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина.

Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

Директор

ООО "Опытный завод «ГНЦЛС» **В.Б. Демехин**