МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-003271/07 - 160714
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Хлорофиллонг®

наименование лекарственного средства

раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия

наименование фирмы-производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 160714 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Информация отсутствует.	*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием этого лекарства.* *Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.* *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.* *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.* *Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось.*

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТУКЦИЯ (информация для потребителей) по применению препарата **Галенофиллипт**	**ИНСТРУКЦИЯ** по применению лекарственного препарата для медицинского применения. **Хлорофиллонг®**
Торговое название препарата: Галенофиллипт	**Торговое название:** Хлорофиллонг®
МНН или группировочное название: Эвкалипта прутовидного листья	**МНН или группировочное название:** Эвкалипта прутовидного листьев настойка
Показания к применению: Местно: в комплексном лечении ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки. Внутрь: для санации кишечника при стафилококконосительстве.	**Показания к применению:** Местно: в комплексном лечении ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки. Внутрь и местно: для санации кишечника при стафилококконосительстве.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.	**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, ***возраст до 18 лет***. При применении внутрь: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы: Для местного применения: при лечении ожогов и трофических язв препарат разводят в соотношении 1:5 в 0,25% растворе новокаина; для смазывания канала шейки матки и эрозии, смачивания вводимых во влагалище тампонов используют неразведенный препарат; для спринцевания влагалища используют раствор, получаемый разведением 1 столовой ложки препарата в 1 л воды. При стафилококковом поражении кишечника: внутрь принимают по 5 мл препарата разведенного в 30 мл воды, 3 раза в день за 40 мин до еды; местно клизмы (20 мл препарата в 1 л воды) назначают 1 раз в 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.	**Способ применения и дозы:** Для местного применения: при лечении ожогов и трофических язв препарат разводят в соотношении 1:5 в 0,25 % растворе новокаина. Используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения - 2-3 недели. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки. Смазывают канал шейки матки и эрозии неразведенным препаратом. Курс лечения – 10 дней. Для спринцевания влагалища используют раствор, получаемый разведением 1 столовой ложки препарата в 1 л воды. Курс лечения – 2 недели. При стафилококковом поражении кишечника принимают внутрь по 5 мл препарата, разведенного в 30 мл воды, 3 раза в день за 40 мин перед едой ежедневно. Препарат применяют также местно ректально в клизме (по 20 мл препарата в 1 л воды – доза для одной клизмы) 1 раз в 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.

Старая редакция	Новая редакция
	Перед применением препарат необходимо взбалтывать. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.
Побочное действие: Возможны аллергические реакции.	**Побочное действие:** Аллергические реакции: отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, ***сообщите об этом врачу***.
Раздел отсутствует.	**Передозировка:** До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.
Особые указания: До лечения необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к препарату. Для этого пациенту дают выпить 25 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды. При отсутствии че-	

Старая редакция	Новая редакция
рез 6-8 часов аллергических реакций (отечности губ, слизистой оболочки носа, зева и др.) можно назначить курсовое лечение препаратом; при наличии аллергических реакций препарат противопоказан. Водителям транспортных средств и лицам, работающим на машинах/механизмах при применении препарата следует учитывать, что препарат содержит этиловый спирт в количестве не менее 85%.	
Взаимодействие с другими лекарственными веществами: Галенофиллипт разрушается при взаимодействии с перекисью водорода. Поэтому после обработки раны раствором перекиси водорода перед использованием Галенофиллипта рану следует промыть стерильным 0,9% раствором натрия хлорида.	**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** При взаимодействии препарата с перекисью водорода выпадает осадок. Поэтому после обработки раны раствором перекиси водорода перед использованием препарата Хлорофиллонг® рану следует промыть стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида. **Особые указания:** До лечения необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к препарату. Для этого пациенту дают выпить 25 капель препарата,

Старая редакция	Новая редакция
	разведенных в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч аллергических реакций (отечности губ, слизистых оболочек, кожных высыпаний) можно назначить курсовое лечение препаратом; при наличии аллергических реакций препарат противопоказан. Содержание абсолютного этилового спирта при приеме препарата внутрь составляет в максимальной разовой дозе – 5,19 г, в максимальной суточной дозе – 15,57 г.
Раздел отсутствует.	**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:** при применении препарата внутрь необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как препарат содержит этиловый спирт.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска: Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой. По 25, 50, 100 мл во флаконы темного стекла, по 100 мл в банки темного стекла, помещенные вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	**Форма выпуска:** Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой. По 25, 50, 100 мл во флаконы темного стекла. По 25, 50 и 100 мл во флаконы стеклянные из коричневого стекла для упаковки медицинских препаратов. По 100 мл во флаконы темного стекла. Каждый флакон вместе с ложкой дозировочной или без или со стаканом мерным или без, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре от 12 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек: Без рецепта.	**Условия отпуска:** Отпускают без рецепта.
Производитель/Организация, принимающая претензии: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» Россия, 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко 24-а, тел/факс: (812) 271 4434.	**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/Производитель/Организация, принимающая претензии:** ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» Россия, 191144, Санкт-

Старая редакция	Новая редакция
	Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а, тел/факс: (812) 271 4434. www.galenopharm.ru

Генеральный директор
ОАО «Фармацевтическая
фабрика Санкт-Петербурга» Т.А. Балаев

«20» июня 2014 г.