МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-003271/07-060715
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Хлорофиллонг®

наименование лекарственного средства

раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой

лекарственная форма, дозировка

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия

наименование фирмы-производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «___» 060715 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: Прозрачная жидкость зеленого цвета с характерным запахом. При хранении возможно выпадение осадка.	**Описание.** Прозрачная жидкость от зеленого до темно-зеленого цвета с характерным запахом. Возможно помутнение жидкости и выпадение осадка в процессе хранения.
Способ применения и дозы: Для местного применения: при лечении ожогов и трофических язв препарат разводят в соотношении 1:5 в 0,25 % растворе новокаина. Используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения - 2-3 недели. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки.	**Способ применения и дозы:** Для местного применения: при лечении ожогов и трофических язв препарат разводят в соотношении 1:5 в 0,25 % растворе новокаина. Используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения - 2-3 недели. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки. Смазывают канал шейки матки и эрозии неразведен-

Старая редакция	Новая редакция
Смазывают канал шейки матки и эрозии неразведенным препаратом. Курс лечения – 10 дней. Для спринцевания влагалища используют раствор, получаемый разведением 1 столовой ложки препарата в 1 л воды. Курс лечения – 2 недели. При стафилококковом поражении кишечника принимают внутрь по 5 мл препарата, разведенного в 30 мл воды, 3 раза в день за 40 мин перед едой ежедневно. Препарат применяют также местно ректально в клизме (по 20 мл препарата в 1 л воды – доза для одной клизмы) 1 раз в 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур. Перед применением препарат необходимо взбалтывать.	ным препаратом. Курс лечения – 10 дней. Для спринцевания влагалища используют раствор, получаемый разведением 15 мл (1 столовой ложки) препарата в 1 л воды. Курс лечения – 2 недели. При стафилококковом поражении кишечника принимают внутрь по 5 мл препарата, разведенного в 30 мл воды, 3 раза в день за 40 мин перед едой ежедневно. Препарат применяют также местно ректально в клизме (по 20 мл препарата в 1 л воды – доза для одной клизмы) 1 раз в 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур. Перед применением препарат необходимо взбалтывать.
Форма выпуска: Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой. По 25, 50, 100 мл во флаконы темного стекла. По 25, 50 и 100 мл во флаконы стеклянные из коричневого стекла для упаковки медицинских препаратов. По 100 мл во флаконы темного стекла. Каждый флакон вместе с ложкой	**Форма выпуска:** Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой. По 25, 50 и 100 мл во флаконы темного стекла. По 25, 50 и 100 мл во флаконы стеклянные из коричневого стекла для упаковки медицинских препаратов. По 25, 50 и 100 мл во флаконы полимерные. По 100 мл во флаконы темного стекла. Каж-

Старая редакция	Новая редакция
дозировочной или без или со стаканом мерным или без, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	дый флакон вместе с ложкой дозировочной или без или со стаканом мерным или без, или шприцем дозировочным или без, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Производитель/ Организация, принимающая претензии: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» Россия, 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а, тел/факс: (812) 271 4434. www.galenopharm.ru	**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Организация, принимающая претензии:** ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия, 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а, тел/факс: (812) 271 4434. www.galenopharm.ru **Производитель:** ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а, лит. Д, лит. З ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Генеральный директор
ОАО «Фармацевтическая
фабрика Санкт-Петербурга» Т.А. Балаев

«18» июня 2015 г.