МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВРОССИИ
ЛП-006439-020920
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Хлорофилум

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Хлорофилум

Международное непатентованное или группировочное наименование: Эвкалипта прутовидного листьев экстракт

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения [масляный] 2%

Состав на 1 мл препарата

Активный компонент:

Хлорофиллипт, экстракт густой (в пересчете на 100 % содержание сухого вещества)	- 0,02 г

Вспомогательное вещество:

Оливковое масло, рафинированное	- до 1 мл

Описание: Прозрачная темно-зеленая маслянистая жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Противомикробное средство растительного происхождения

Код АТХ: D06BX

Фармакологическое действие

Препарат - смесь хлорофиллов, получаемая из листьев эвкалипта. Оказывает антибактериальное (бактериостатическое и бактерицидное) действие, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Также обладает противовоспалительными свойствами.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами; ожоги, долго незаживающие раны и трофические язвы конечностей; эрозия шейки матки; в период грудного вскармливания для предупреждения трещин сосков.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности применение препарата противопоказано. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат для местного и наружного применения.

При лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей Хлорофилум используют в виде пропитанных масляным раствором марлевых повязок. Процедуру можно чередовать с применением 1 % спиртового раствора Хлорофилума, разведенного 0,25 % раствором новокаина в соотношении 1:5. Курс лечения 2-3 недели.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и масляным раствором Хлорофилума смазывают канал шейки матки. Смоченный в препарате тампон оставляют на шейке матки на 15-20 минут. Манипуляции проводят в течение 10 дней ежедневно. В дальнейшем, на протяжении 2-х недель, после каждого спринцевания тампон, обильно смоченный масляным раствором Хлорофилума оставляют во влагалище на 12 часов. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

С целью предупреждения трещин сосков у кормящих матерей смазывают соски после каждого кормления ребенка. Перед началом следующего кормления препарат тщательно смывают кипяченой водой.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При превышении рекомендованных доз возможно усиление побочного действия.

До настоящего времени случаев передозировки при правильном применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода Хлорофилум выпадает в осадок, поэтому после промывания раны перекисью водорода ее остатки должны быть удалены стерильным изотоническим раствором хлорида натрия.

Особые указания

При лечении эрозии шейки матки для спринцевания используют 1 % спиртовой раствор Хлорофилума, разведенный в соотношении: 1 столовая ложка спиртового раствора на 1 л воды.

До лечения необходимо проверить чувствительность больного к препарату путем местной аппликации небольшого количества препарата. При отсутствии через 6-8 часов признаков аллергии (отечность губ, слизистой зева и др.) можно назначить курсовое лечение препаратом, при наличии аллергических реакций препарат противопоказан.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения [масляный] 2%.

По 10, 25, 40, 50, 100 мл во флаконы из темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками пластмассовыми, или пробками-капельницами, и/или крышками навинчиваемыми, или с распылительной насадкой полимерной, и/или крышка с пипеткой, или укупорочными средствами.

По 10, 25, 40, 50, 100 мл во флаконы-капельницы из темного стекла, укупоренные пробками-капельницами в комплекте с крышкой навинчиваемой, или пробками-капельницами в комплекте с крышками навинчиваемыми, или пробками-капельницами в комплекте с крышкой навинчиваемой, или с распылительной насадкой полимерной, и/или крышка с пипеткой.

По 10, 25, 40, 50, 100 мл во флаконы из полимерных материалов из полиэтилена низкого давления в комплекте с пробками полимерными и крышками навинчиваемыми, или в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками, или с распылительной насадкой полимерной, и/или крышка с пипеткой.

Каждый флакон или флакон-капельницу по 10, 25, 40, 50, 100 мл вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона для потребительской тары или картона хром-эрзац макулатурного мелованного, или допускается индивидуальная упаковка по 2, 3 или 4 флаконов в одну потребительскую пачку с вложением инструкции по медицинскому применению, на каждый флакон или флакон-капельницу. Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ˚С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Название и адрес производителя

АО «РФК». Россия, 303657, Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Ключики.

Тел/факс: (495) 649-92-61

e-mail: rfkrus@gmail.com

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Салюд», Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская д. 13, стр. 15, этаж 5, помещение XI, комната 1

Тел. 8-985-992-45-93

E-mail: saludao@mail.ru

Генеральный директор
АО «САЛЮД» А.В. Наумов