ЛП-№(012307)-(РГ-RU) от 31.10.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27120
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЕКТУСИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пектусин

Международное непатентованное или группировочное наименование: эвкалипта шарикового листьев масло + [левоментол]

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку

Действующие вещества: левоментол (L-ментол) – 4,0 мг, эвкалипта шарикового листьев масло (эвкалиптовое масло) – 0,5 мг;

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый) – 672,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 101 – 50,0 мг, β-циклодекстрин – 40,0 мг, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы – 2,3 мг, тальк – 23,2 мг, кальция стеарат – 8,0 мг.

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого с кремоватым оттенком цвета, с риской, с характерным запахом. На поверхности таблеток допускается мраморность и вкрапления темного или светлого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

Код АТХ: R07AX.

Фармакологические свойства

Обладает слабым противомикробным и противовоспалительным действием.

Показания к применению

Препарат применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 8 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27120
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Сахарный диабет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения во время беременности и в период грудного вскармливания назначение препарата данной группе пациентов не рекомендовано.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. Взрослым – по 1 таблетке 3−4 раза в день, детям старше 8 лет – по 1 таблетке 1−2 раза в день. Длительность лечения − 5 дней.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Информация для пациентов с сахарным диабетом: в разовой дозе препарата (1 таблетка) содержится около 0,72 г углеводов, что соответствует 0,06 ХЕ; в максимальной суточной дозе для взрослых (4 таблетки) – около 2,88 г углеводов, что соответствует 0,24 ХЕ.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27120
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания, 0,5 мг + 4,0 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с равным количеством инструкций по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / организация, принимающая претензии потребителей

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"

(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

тел./факс: +7 (4712) 34-03-13

www.pharmstd.ru

Производитель

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.10.2025 № 27120
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"

(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

тел./факс: +7 (4712) 34-03-13

www.pharmstd.ru