ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГИНО-ПЕВАРИЛ®
(GYNO-PEVARYL®)

Регистрационный номер:

Международное непатентованное название: эконазол

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

СОСТАВ:
1 суппозиторий вагинальный содержит:

Активное вещество: эконазола нитрат - 50 мг,150 мг

Вспомогательные вещества: твердый жир (тип А и тип Б).

Описание:
Суппозитории от белого до почти белого цвета, торпедообразной формы, с запахом жира.

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковое средство.

Код АТХ G01AF05.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Эконазол – синтетическое производное имидазола. Оказывает местное противогрибковое и антибактериальное действие. Тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Легко растворяется в липидах и хорошо проникает в ткани. Активен в отношении дерматофитов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, дрожжеподобных грибов рода Candida, плесневых грибов, а также Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare) и Corinebacterium minutissimum; и некоторых грамположительных бактерий (стрептококки, стафилококки).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вульвовагинит, кольпит грибковой этиологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ

Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Интравагинально.

Суппозитории по 50 мг

Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение не менее 14 дней. Необходимо провести полный курс лечения, несмотря на исчезновение субъективных симптомов (зуд, жжение).

Суппозитории по 150 мг

Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х дней.

В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения вагинального кандидоза возможно его увеличение до 6 дней и проведение повторного курса через 10 дней.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При применении Гино-Певарил может наблюдаться местное раздражение (чувство жжения, зуд) или явление сенсибилизации, а также спазм мышц таза, кожные высыпания и головная боль. В этих случаях врач должен рассмотреть возможность

отмены применения данного препарата и назначить другое лечение. Если после применения препарата возникнут побочные эффекты, которые не указаны в данной информации, то о них следует сообщить врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

До настоящего времени сведений о передозировке не имеется.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Клинические испытания и применение препарата в медицинской практике не выявили несовместимости или взаимодействия с другими лекарствами. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время менструации препарат вводят интравагинально по обычной схеме.

При вульвовагинальных микозах обязательно лечение и полового партнера.

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Суппозитории 50 мг.

По 5 суппозиториев в блистере из ПВХ и полиэтилена низкой плотности. 3 блистера помещают в картонную пачку с вложенной инструкцией по применению.

Суппозитории 150 мг.

По 3 суппозитория в блистере из ПВХ и полиэтилена низкой плотности. 1 блистер помещают в картонную пачку с вложенной инструкцией по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 15 до 30 ^{0}С.

Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

По рецепту врача.

Производитель: Силаг АГ, Шаффхаузен, CH-8205, Хохштрассе, 201, Швейцария

Держатель регистрационного удостоверения в РФ : Янссен Фармацевтика Н.В., Бельгия

Претензии по качеству препарата направлять по адресу:

Москва, 121614, ул. Крылатская, 17, корп.2

Тел.: (495) 755-83-57

Факс: (495) 755-83-58

И.о. директора ИДКЭЛС С.В.Буданов

Представитель компании С.В.Арутюнян