МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

По медицинскому применению

ГИНО-ПЕВАРИЛ®
GYNO-PEVARYL

Регистрационный номер № П N013579/01

Изменение № 1

Срок введения изменений с «04» 07 2009 г.

Старая редакция	Новая редакция
Показания к применению Вульвовагинит, кольпит грибковой этиологии.	**Показания к применению** Гино-Певарил® показан для лечения вульвовагинальных микозов. **Предупреждения и меры предосторожности** Одновременное применение латексных презервативов или диафрагм и вагинальных противоинфекционных препаратов может снижать эффективность латексных барьерных контрацептивов. По этой причине Гино-Певарил® не рекомендуется использовать одновременно с диафрагмой или презервативом. Пациенты, использующие спермицидные контрацептивы, должны посоветоваться со своим врачом, поскольку препараты, назначаемые для интравагинального введения, могут инактивировать спермицидный контрацептив. Гино-Певарил® не следует использовать в сочетании с другими препаратами для лечения заболеваний гениталий, назначаемыми внутрь или

	наружно. В случае возникновения сильного раздражения лечение Гино-Певарилом необходимо прекратить. У пациентов, чувствительных к имидазолам, возможна повышенная чувствительность и к эконазола нитрату. Препарат не предназначен для перорального применения. Данные о безопасности и эффективности Гино-Певарила у детей до 16 лет отсутствуют. Данные о применении Гино-Певарила у пожилых лиц (старше 65 лет) недостаточны.
Беременность и период кормления грудью Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.	**Беременность и период кормления грудью** *Беременность* Гино-Певарил® способен всасываться из влагалища в системный кровоток, поэтому его не следует применять в течение первого триместра беременности, если только врач не решит, что лечение этим препаратом важно для здоровья пациентки. Во время второго и третьего триместров беременности Гино-Певарил® можно применять, если его потенциальная польза для женщины превосходит возможный риск для плода. *Лактация* Неизвестно, проникает ли эконазола нитрат в грудное молоко. В период кормления грудью препарат следует применять с осторожностью.
Способ применения и дозы Интравагинально. Суппозитории по 50 мг Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении	**Способ применения и дозы** Интравагинально. Суппозитории по 50 мг Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении

лежа, непосредственно перед сном в течение не менее 14 дней. Необходимо провести полный курс лечения, несмотря на исчезновение субъективных симптомов (зуд, жжение). Суппозитории по 150 мг Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х дней. В случае недостаточной эффективности стандартного 3-дневного курса лечения вагинального кандидоза возможно его увеличение до 6 дней и проведение повторного курса через 10 дней.	лежа, непосредственно перед сном в течение не менее 14 дней. Необходимо провести полный курс лечения, несмотря на исчезновение субъективных симптомов (зуд, бели). Суппозитории по 150 мг Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х дней. В случае рецидива или положительного результата культурального исследования через 1 неделю после проведенного лечения проводят второй курс лечения.
Передозировка До настоящего времени сведений о передозировке не имеется.	**Передозировка** До настоящего времени сведений о передозировке не имеется. При случайном приеме препарата внутрь могут возникнуть тошнота, рвота и диарея. В таких случаях при необходимости следует проводить симптоматическую терапию.
Взаимодействия с другими препаратами и другие формы взаимодействия Клинические испытания и применение препарата в медицинской практике не выявили несовместимости или взаимодействия с другими лекарствами. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.	**Взаимодействия с другими препаратами и другие формы взаимодействия** Соответствующих исследований не проводилось. Учитывая химическую схожесть эконазола с производными имидазола, существует вероятность конкурентного взаимодействия эконазола нитрата с веществами, метаболизируемыми ферментами CYP3A4/2C29. Однако, принимая во внимание, что препарат слабо всасывается в системный кровоток, возникновение клинически значимых взаимодействий маловероятно. Пациенты, принимающие оральные антикоагулянты, такие как варфарин и аценокумарол должны соблюдать осторожность и следить за параметрами

	свертываемости крови. Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Представитель фирмы С.В.Арутюнян