МИНЗДРАВ РОССИИ
П N013579/01- 040319
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Гино-Певарил®

Суппозитории вагинальные, 50 мг, 150мг

Сянь-Янссен Фармасьютикал Лтд., Китай

Янссен Фармацевтика НВ, Бельгия

Лузомедикамента Сосьедаде Текника Фармасеутика, Португалия

Изменение № 10

040319

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Беременность и период кормления грудью *Беременность* Гино-Певарил® способен всасываться из влагалища в системный кровоток, поэтому его не следует применять в течение первого триместра беременности, если только врач не решит, что лечение этим препаратом важно для здоровья пациентки. Во время второго и третьего триместров беременности Гино-Певарил® можно применять, если его потенциальная польза для женщины превосходит возможный риск для плода. *Лактация* Неизвестно, проникает ли эконазола нитрат в грудное молоко. В период кормления грудью препарат следует применять с осторожностью.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** *Беременность* Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Данные о применении препарата Гино-Певарил® у беременных женщин отсутствуют. Эконазол способен всасываться из влагалища в системный кровоток, поэтому при беременности препарат Гино-Певарил® применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. *Период грудного вскармливания* У крыс эконазол и/или его метаболиты выделяются с грудным молоком и были обнаружены у потомства. Неизвестно, проникает ли эконазол в грудное молоко человека. В период грудного вскармливания препарат Гино-Певарил® применяют только в случае, если

	предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.
Передозировка До настоящего времени сведений о передозировке не имеется. При случайном приеме препарата внутрь могут возникнуть тошнота, рвота и диарея. В таких случаях при необходимости следует проводить симптоматическую терапию.	**Передозировка** До настоящего времени сведения о передозировке при интравагинальном применении ограниченны. При передозировке или неправильном применении препарата усиливаются дозозависимые побочные эффекты, описанные в разделе «Побочное действие». При случайном приеме препарата внутрь могут возникнуть тошнота, рвота и диарея. В таких случаях при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Специалист по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»

Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон» (для документов) * Москва * ОГРН 1027739229 40

Федорова А.В.