ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ИФЕНЕК IFENEC

Регистрационный номер:
Торговое название препарата: Ифенек.
Международное непатентованное название: Эконазол.
Лекарственная форма: крем для наружного применения.
СОСТАВ: 100 г крема содержат:
Активное вещество: эконазола нитрат - 1,0 г.
Вспомогательные вещества: бензойная кислота, твердый жир, бутилгидроксианизол, парафин жидкий, макрогола пальмитилстеарат (полиоксиэтиленгликоль пальмитат стеарат), вода очищенная.
Описание: белый или почти белый однородный крем.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противогрибковое средство.
Код АТХ D01AC03

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эконазол – синтетическое производное имидазола. Оказывает местное противогрибковое и антибактериальное действие. Тормозит биосинтез эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной стенки микроорганизмов. Легко растворяется в липидах и хорошо проникает в ткани. Активен в отношении дерматофитов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, дрожжеподобных грибов рода Candida , а также Malassezia furfur (Pityrosporum orbiculare), вызывающего разноцветный лишай и Corinebacterium minutissimum, некоторых грамположительных бактерий (стрептококки, стафилококки).
Фармакокинетика
При нанесении на кожу системная абсорбция незначительна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Грибковые поражения кожи и волосистой части головы, разноцветный лишай, эритразма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ

Применение препарата при беременности возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Только для взрослых. Крем наносят на поражённые участки кожи и слегка втирают. Процедуру проводят 1 раз в день при микозе стоп, кистей и туловища; разноцветном лишае и эритразме - 2 раза в день (утром и вечером).
Длительность терапии индивидуальна и зависит от тяжести и локализации заболевания. Для достижения полного выздоровления не следует прекращать лечение кремом сразу же после исчезновения острых симптомов воспаления или субъективных жалоб. Длительность терапии должна составлять, в среднем, около 4 недель.
Разноцветный лишай излечивается, в основном, в течение 1-3 недель, эритразма в течение 2-4 недель, а дерматомикозы в течение 4 недель. При лечении высококератизированных участков кожи (стоп) – до 1,5 месяцев.

Для предотвращения рецидива микоза стоп после разрешения клинических проявлений лечение следует продолжить еще в течение 2 недель.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Обычно Ифенек переносится хорошо, даже в случае чувствительной кожи. В редких случаях возможно раздражение, ощущение жжения и зуда, покраснение кожи, сыпь. При длительном применении – гиперпигментация и атрофические изменения кожи. Если после применения препарата возникнут побочные эффекты, которые не указаны в данной информации, то о них следует сообщить врачу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Клинические испытания и применение препарата в медицинской практике не выявили несовместимости или взаимодействия с другими лекарствами. Рекомендуется информировать врача об одновременном лечении другими лекарственными препаратами.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Только для наружного применения. При отсутствии эффекта в указанные сроки терапии следует прекратить лечение и пересмотреть диагноз. При появлении первых симптомов, свидетельствующих о повышенной чувствительности или раздражении, препарат необходимо отменить. Следует избегать попадания препарата в глаза.

ФОРМА ВЫПУСКА

Крем для наружного применения 1 %. По 30 г препарата в алюминиевую тубу, изнутри покрытую эпоксифенольной защитной смолой, с алюминиевым защитным слоем первого вскрытия, укупоренную колпачком из ПВД. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Янссен-Силаг С.п.А., Италия.
улица Янссен, Борго С.Микеле, Латина.
Держатель регистрационного удостоверения:
Италфармако С.п.А., Италия.
20126, Милан, Вьяле Фульвио Тести, 330.
Претензии по качеству препарата принимает
Представительство АО “Италфармако”, г. Москва
119002, Москва, Глазовский пер., д.7, офис 12.

Глава Представительства
АО “Италфармако” Л.И.Никова

И.о.директора ИДКЭЛ А.Н.Васильев